

MORTALIDAD POR SUICIDIO EN LAS AMÉRICAS



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

INFORME REGIONAL

MORTALIDAD POR SUICIDIO EN LAS AMÉRICAS

INFORME REGIONAL



Salud Mental, Discapacidades y Rehabilitación (THR/MH)
Información y Análisis de la Salud (HSD/HA)

Este informe ha sido elaborado y coordinado por el Proyecto de Salud Mental, Discapacidades y Rehabilitación (THR/MH) en colaboración con el Proyecto de Información y Análisis de la Salud (HSD/HA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Queremos expresar nuestro reconocimiento al grupo de profesionales de ambos proyectos que han participado en la preparación y redacción de este informe y, en especial, al doctor Robert Kohn por su labor central en el proceso de trabajo como experto y asesor temporal; así como a Matt Sumner, Angee Baldini y Judith Ciprés Vidal, quienes también participaron en las diferentes etapas de labor.

Si desea obtener más información por favor contactarse con:
Proyecto de Salud Mental, Discapacidad y Rehabilitación (THR/MH)
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
525 23rd Street, NW, Washington, D.C. 20037, Estados Unidos de América
Correo electrónico: rodrigjo@paho.org

*Diseño: Tinto Estudio, S.A.
Impreso en los Talleres de Impresora Pacífico, S.A.*

ISBN: 978-9962-642-42-8

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
METODOLOGÍA	7
RESULTADOS	9
I. Visión general del suicidio en las Américas	
II. Género y suicidio	
III. Edad y suicidio	
IV. Métodos de suicidio	
V. Tendencias de las tasas de suicidio desde 1990	
VI. Validez y limitaciones de los datos	
CONSIDERACIONES FINALES	15
BIBLIOGRAFÍA	17
LISTA DE CUADROS Y FIGURAS	19

Cuadros

- | | |
|-------------|--|
| Cuadro 1.1. | Tasas de suicidio por 100.000 habitantes en las subregiones de las Américas y en determinados países, tasas no ajustadas y ajustadas según la edad, 2000 – 2004 |
| Cuadro 1.2. | Orden de importancia y porcentaje (entre paréntesis) de la contribución del suicidio entre otras causas de muerte en las subregiones de las Américas, por sexo y edad, 2000-2004 |
| Cuadro 1.3. | Orden de importancia y porcentaje (entre paréntesis) de la contribución del suicidio entre otras causas de muerte en determinados países, por sexo y edad, 2000-2004 |
| Cuadro 1.4. | Porcentaje de contribución del suicidio entre las causas externas de muerte en las subregiones de las Américas, por sexo y edad, 2000-2004 |
| Cuadro 1.5. | Porcentaje de contribución del suicidio entre las causas externas de muerte en determinados países, por sexo y edad, 2000-2004 |
| Cuadro 2.1. | Razón hombre-mujer de suicidios, por grupos de edad, en las subregiones de las Américas y en determinados países, 2000-2004 |
| Cuadro 3.1. | Tasas de suicidio por 100.000 habitantes, por grupos de edad, en las subregiones de las Américas, 2000-2004 |
| Cuadro 3.2. | Tasas de suicidio por 100.000 habitantes, por grupos de edad, en determinados países, 2000-2004 |
| Cuadro 4.1. | Métodos de suicidio utilizados en las subregiones de las Américas y en determinados países, porcentaje del total para ambos sexos, 2000-2004 |
| Cuadro 4.2. | Métodos de suicidio utilizados en las subregiones de las Américas y en determinados países, porcentaje en hombres, 2000-2004 |
| Cuadro 4.3. | Métodos de suicidio utilizados en las subregiones de las Américas y en determinados países, porcentaje en mujeres, 2000-2004 |
| Cuadro 4.4. | Razón hombre-mujer según los métodos de suicidio utilizados en las subregiones de las Américas y en determinados países, no ajustada según la edad, 2000-2004 |

- Cuadro 4.5. Métodos de suicidio utilizados según la edad y las subregiones de las Américas, porcentaje del total para ambos sexos, 2000-2004
- Cuadro 4.6. Métodos de suicidio utilizados según la edad y las subregiones de las Américas, porcentaje en hombres, 2000-2004
- Cuadro 4.7. Métodos de suicidio utilizados según la edad y las subregiones de las Américas, porcentaje en mujeres, 2000-2004
- Cuadro 4.8. Métodos de suicidio utilizados según la edad en determinados países de las Américas, porcentaje del total para ambos sexos, 2000-2004
- Cuadro 4.9. Métodos de suicidio utilizados según la edad en determinados países de las Américas, porcentaje en hombres, 2000-2004
- Cuadro 4.10. Métodos de suicidio utilizados según la edad en determinados países de las Américas, porcentaje en mujeres, 2000-2004
- Cuadro 5.1. Coeficientes de correlación de las tendencias del suicidio, por sexo, en las subregiones de las Américas y en determinados países, tasas no ajustadas según la edad, de 1990 al 2004
- Cuadro 5.2. Tasas de suicidio por 100.000 habitantes en las subregiones de las Américas y en determinados países, por años, tasas ajustadas según la edad para ambos sexos, 1990-2004
- Cuadro 5.3. Tasas de suicidio en hombres, por 100.000 habitantes, en las subregiones de las Américas y en determinados países, por años, tasas no ajustadas según la edad, 1990-2004
- Cuadro 5.4. Tasas de suicidio en mujeres, por 100.000 habitantes, en las subregiones de las Américas y en determinados países, por años, tasas no ajustadas según la edad, 1990-2004
- Cuadro 5.5. Coeficientes de correlación de las tendencias del suicidio, por edad, en las subregiones de las Américas y en determinados países, 1990-2004
- Cuadro 6.1. Diferencia porcentual entre el número de muertes por suicidio corregida y no corregida para causas no determinadas en las subregiones de las Américas y en determinados países, 2000-2004
- Cuadro 6.2. Orden de importancia y porcentaje (entre paréntesis) de la contribución de las enfermedades mentales (capítulo V de la CIE) entre otras causas de muerte entre los 10-59 años de edad, en las subregiones de las Américas y en determinados países, según el sexo, 2000-2004.

Figuras

- Figura 1. Porcentaje de suicidios entre hombres comparado con mujeres en las subregiones de las Américas y en determinados países, 2000-2004
- Figura 2. Métodos de suicidio utilizados en las subregiones de las Américas, porcentaje del total para ambos sexos, 2000-2004
- Figura 3. Tasas de suicidio en las subregiones de las Américas, por años, de 1990 al 2004, no ajustadas según la edad, ambos性
- Figura 4. Porcentaje de defunciones de intención no determinada entre las causas externas, por sexo, en las subregiones de las Américas, 2000-2004
- Figura 5. Porcentaje de muertes debidas a síntomas, signos y condiciones mal definidas, por sexo, en las subregiones de las Américas, 2000-2004

Apéndice

- Cuadro A1.1. Tasas de suicidio por 100.000 habitantes, no ajustadas según la edad, de 1990 al 2004, y el último año disponible
- Cuadro A1.2. Tasas de suicidio por 100.000 habitantes, ajustadas según la edad, de 1990 al 2004, y el último año disponible
- Cuadro A2.1. Razón hombre-mujer de suicidios por grupos de edad, 2000-2004
- Cuadro A3.1. Tasas de suicidio por 100.000 habitantes por grupos de edad, ambos sexos, 2000-2004,
- Cuadro A3.2. Tasas de suicidio en hombres por 100.000 habitantes por grupos de edad, 2000-2004
- Cuadro A3.3. Tasas de suicidio en mujeres por 100.000 habitantes por grupos de edad, 2000-2004
- Cuadro A4.1. Métodos de suicidio utilizados, porcentaje del total para ambos sexos, 2000-2004
- Cuadro A4.2. Métodos de suicidio utilizados, porcentaje en hombres, 2000-2004
- Cuadro A4.3. Métodos de suicidio utilizados, porcentaje en mujeres, 2000-2004
- Cuadro A5.1. Coeficientes de correlación de las tendencias del suicidio según el sexo, tasas no ajustadas según la edad
- Cuadro A6.1. Porcentaje estimado de subregistro de mortalidad alrededor del año 2000
- Cuadro A6.2. Porcentaje de causas indeterminadas de muerte entre las causas externas, 2000-2004
- Cuadro A6.3. Porcentaje de muertes de intención no determinada debido a síntomas, signos o condiciones mal definidas, 2000-2004
- Cuadro A6.4. Diferencia porcentual del número de muertes por suicidio corregida y no corregida para causas indeterminadas, 2000-2004

INTRODUCCIÓN

Según cálculos recientes a nivel global, correspondientes al año 2004, el suicidio o a las lesiones autoinfligidas son la decimosexta causa principal de muerte en el mundo (OMS, 2008), y se prevé que en el año 2030 ocupen el duodécimo lugar (Mathers y Loncar, 2006). Actualmente, el suicidio ocupa el vigésimo lugar con respecto a las principales causas de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) (OMS, 2008), y se prevé que en el año 2030 ocupe el decimocuarto lugar (Mathers y Loncar, 2006). Tanto en los hombres como en las mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, el suicidio se clasifica como una de las diez causas principales de carga de enfermedad; para ambos sexos combinados, se ubica en el octavo lugar (OMS, 2008).

Históricamente, América Latina ha observado tasas de suicidio inferiores al promedio mundial (Vijayakumar y cols., 2005). Aunque ello puede atribuirse a muchos factores, es importante mencionar que los datos de mortalidad correspondientes a esta Subregión han sido a menudo descritos como irregulares, especialmente cuando se los compara con los provistos por países europeos (Bertolote y Fleischman, 2002). Desde una perspectiva más amplia, el retraso temporal en la llegada de la información ilustra algunos de los retos fundamentales con respecto a la caracterización y la notificación de las muertes autoinfligidas. Por otro lado, las grandes diferencias existentes entre las tasas de los distintos países obstaculizan alcanzar conclusiones definitivas con respecto a las tendencias del suicidio.

Una de las dificultades para evaluar las tendencias del suicidio proviene directamente del mismo proceso de notificación de datos, cuya validez puede verse enturbiada por factores culturales y religiosos, la estigmatización y la clasificación incorrecta (Wasserman, 2005). También existen diferencias entre los distintos países en cuanto a la legislación y a la manera de clasificar las defunciones como suicidios. Al estar relacionada con la clasificación de una muerte como suicidio, la determinación de la intención es un asunto en el que repercuten no solo los aspectos legales, sino también otros factores como los arriba mencionados. Por ello, es importante reconocer que puede existir un subregistro de las tasas de suicidio (Phillips, 2004).

Por otra parte, debe señalarse que aunque las tasas de suicidio siguen constituyendo el paradigma concluyente para la comparación internacional, también es esencial tener en cuenta las cifras absolutas de muertes y los intentos de suicidio. A pesar de estas numerosas complejidades en relación con las tendencias del suicidio, se percibe la existencia de un patrón: la tasa mundial de suicidio sigue creciendo. Según la OMS (OMS, 2003; Bertolote y cols., 2005), en los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado a escala mundial en un 60% y el suicidio se ha convertido en una de las tres principales causas evitables de muerte en ambos sexos.

A escala mundial, los hombres tienen una tasa de suicidio significativamente más alta que las mujeres, con una razón aproximada de 3,5:1 (OMS, 2001). Es sabido que la mortalidad por suicidio afecta a los hombres con una mayor frecuencia que a las mujeres, aunque los intentos de suicidio son más probables en las mujeres que en los hombres (OMS, 2001). El hecho de que los intentos de suicidio sean menos exitosos en las mujeres que en los hombres quizás pueda ser explicado, entre otros factores, porque ellos tienden a emplear métodos de suicidio más violentos y letales (OMS, 2001). Hasta la fecha, China es uno de los pocos países donde las tasas de suicidio en las mujeres son más altas que en los hombres. Esta tendencia se observa en las zonas rurales donde el envenenamiento con plaguicidas, que se pueden conseguir fácilmente en la mayor parte de los hogares campesinos, es el método más utilizado.

En muchos países existe una alta correlación entre la edad y la conducta suicida. Por ejemplo, en los Estados Unidos, se produce un suicidio por cada 100 a 200 intentos entre las personas de 15 a 24 años de edad (Goldsmith y cols., 2002). Sin embargo, en las personas de 65 años o mayores, se produce un suicidio por cada cuatro intentos (Friedmann y Kohn, 2008). A escala mundial, el suicidio también es la principal causa evitable de muerte en los adultos jóvenes de 15 a 34 años. En muchos países, las tasas más elevadas se han desplazado de los ancianos a las personas más jóvenes, a las del grupo de 35 a 45 años, o incluso a las del grupo de 15 a 25 años. A escala mundial, el suicidio se encuentra entre las cinco causas principales de muerte en adultos jóvenes de ambos性os (Bertolote y cols., 2005).

El análisis de los métodos de suicidio proporciona una perspectiva útil para abordar el tema de la prevención. La disponibilidad y accesibilidad a medios letales como las armas de fuego u otras armas y los productos tóxicos o venenosos se correlacionan con un mayor riesgo de suicidio. Se ha demostrado que la posesión de armas de fuego y su presencia en el hogar aumentan el riesgo de suicidio (Leenaars y cols., 2009). Algunos estudios han señalado que las leyes dirigidas a controlar la tenencia de armas de fuego pueden reducir el número de suicidios, pero los resultados no son uniformes.

La salud mental y el suicidio están estrechamente relacionados. Más del 90% de los casos de suicidio se asocian con trastornos psiquiátricos, aunque también existen otros factores sociales, económicos y culturales, que influyen en este comportamiento (Henriksson y cols., 1993). Los trastornos mentales predominantes en las personas que se suicidan son los trastornos afectivos y la esquizofrenia (Osborn y cols., 2008; Rihmer, 2007).

El objetivo de este informe es proporcionar una visión general del comportamiento de la mortalidad por suicidio en las Américas, a nivel regional, subregional, y en determinados países seleccionados. En él se analizará la distribución del suicidio según la edad, el sexo, los métodos empleados y las tendencias del suicidio con el transcurso del tiempo.

M E T O D O L O G Í A

Los datos en materia de suicidio en la Región de las Américas se basan en el número de defunciones notificadas a la Organización Mundial de la Salud por los países desde el año 1990 al 2005. Las tasas se calcularon teniendo en cuenta las cifras de población de las Naciones Unidas para cada país (revisión del 2006) correspondientes a estos años y se ajustaron para corregir el subregistro de la mortalidad utilizando el método descrito en *Estadísticas de Salud en las Américas, Edición 2006* (OPS, 2006). Los datos de mortalidad analizados son los relativos a las lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84) según la *Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión*, (OMS, 2008). Para facilitar las comparaciones entre las regiones y los países se calcularon las tasas estandarizadas por 100.000 habitantes, ajustadas según la edad, mediante el método directo empleando la población estándar mundial (OPS, 2006).

Con objeto de disponer de tasas de suicidio estables, las mismas se obtuvieron durante períodos de 5 años, de 1990 a 1994, de 1995 a 1999, y del 2000 al 2004. La razón hombre-mujer se define como el número de muertes por suicidio en hombres por 100.000 habitantes, dividido por el número de defunciones por suicidio en mujeres por 100.000 habitantes. Si el sexo no tuviera ningún efecto sobre el suicidio, la razón tendría un valor de 1,0. Si el valor es superior a 1,0 existe un mayor riesgo de muerte por suicidio entre los hombres que entre las mujeres, mientras que los valores inferiores a 1,0 indican un mayor número de defunciones entre las mujeres. Se determinaron de forma estadísticamente significativa las tendencias en cuanto al cambio en las tasas de suicidio en un período de 15 años, de 1990 al 2004; para ello se empleó el coeficiente de correlación de Pearson con un valor $p \leq 0,05$. La evaluación del método de suicidio se basó en el porcentaje del número total de suicidios.

La Región de las Américas fue subdividida en distintas subregiones: América del Norte (Bermudas, Canadá, Estados Unidos); América Central (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá); Caribe latino (Cuba, Guadalupe, Guayana Francesa, Haití, Martinica, Puerto Rico, República Dominicana); Caribe no latino (Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago); y América del Sur, que comprendió la Región Andina y el Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela). Debido a su extensión geográfica y gran cantidad de población, Brasil y México fueron consideradas como subregiones separadas. En América Latina y el Caribe se incluyen a todos los países con la excepción de Bermudas, Canadá y Estados Unidos.

Además de analizar las características epidemiológicas del suicidio en las distintas subregiones del continente americano, en este informe también se estudiarán los datos epidemiológicos de ocho países seleccionados por su relevancia geográfica y poblacional, así como por la fiabilidad de sus datos. Ellos son: Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos, México, Nicaragua y Uruguay. Estos países disponían información reciente sobre suicidio (como mínimo del año 2004), y poseían estadísticas anuales regulares en materia de tasas de suicidio y recuento de defunciones. En el apéndice se incluyen datos sobre suicidio provenientes de todos los países de las Américas que disponían de ellos.

Los datos sobre suicidio son analizados por sexo y edad. También se evalúa la posición que ocupa el suicidio entre las seis causas principales de muerte y entre 67 subgrupos de causas de muerte. Por último, se analiza el método de suicidio utilizado y se exploran las tendencias del suicidio entre los años 1990 y 2004.

RESULTADOS

I. Panorama del suicidio en la Región de las Américas

Con aproximadamente 63.000 defunciones anuales y una tasa de mortalidad ajustada según la edad de 7,4 por 100.000 habitantes en el periodo 2000-2004, el suicidio constituye un problema de salud pública de gran relevancia en las Américas. Los países que disponían de datos completos presentaban un espectro variable de tasas de suicidio (Cuadro A1.2) y en los países más extensos, la fluctuación de las tasas de suicidio generalmente era menor.

Desde una perspectiva regional, el Caribe no latino y América del Norte presentaron las tasas más elevadas en el periodo 2000-2004, mientras que las tasas más bajas se observaron en México y Brasil. En muchos países del Caribe no latino, aún no se dispone de datos completos sobre la mortalidad por suicidio.

La tasa correspondiente a América Latina y el Caribe fue de 5,8 por 100.000 habitantes para ambos sexos. Por subregiones, las tasas anuales de suicidio por 100.000 habitantes, conjuntas

para ambos性os, fueron las siguientes: América del Norte, 9,5; México, 4,4; Centroamérica, 7,5; Caribe latino, 7,6; Caribe no latino, 13,4; Brasil, 5,3 y América del Sur, 6,3 (Cuadro 1.1).

Si se incluían todos los grupos de edad, el suicidio en la Región constituía la 27.a principal causa de muerte; la 21.^a entre los hombres y la 38.^a entre las mujeres. En el Caribe no latino, se situaba en la 18.^a posición (Cuadro 1.2). Era la tercera causa principal de muerte en las Américas entre las personas de 10 a 24 años de edad. En los países seleccionados el suicidio también se sitúa como una de las principales causas de muerte en los grupos de menor edad (Cuadro 1.3).

El suicidio representaba el 12% de las causas externas de muerte, pero ello variaba según la subregión, con un 19,7% en América del Norte y solo un 7,8% en Centro América (Cuadro 1.4). En el Cuadro 1.5, se puede observar el porcentaje que representa el suicidio entre las causas externas de muerte en los países seleccionados. Por lo general, los países en donde el suicidio contribuye en menor cuantía a las

causas externas de muerte presentan tasas superiores de decesos por homicidio.

II. Género y suicidio

Las tasas de suicidio ajustadas según la edad en la Región eran de 11,9 por 100.000 en los hombres, y de 3,1 por 100.000 entre las mujeres (cuadro 1.1). En América Latina y el Caribe las tasas en los hombres y en las mujeres fueron de 9,4 y 2,5 por 100.000, respectivamente. Con respecto al suicidio en las mujeres, los países seleccionados que presentaban tasas más elevadas eran: Nicaragua, Cuba y Uruguay.

En las Américas, al igual que en otras partes del mundo, las tasas de suicidio en hombres seguían siendo superiores a las observadas en las mujeres, y representaban más del 79% de todas las defunciones por suicidio (Figura 1). En promedio, la razón hombre-mujer, ajustada según la edad, era de 3,8. En Centroamérica se observó la razón hombre-mujer, ajustada según la edad, más reducida, ya que era de 2,9. En los ocho países seleccionados, la razón hombre-mujer ajustada según la edad variaba entre 2,4 en Cuba y 5,9 en Chile (Cuadro 2.1).

A nivel regional, en todos los grupos de edad, los hombres presentaban mayores tasas de suicidio. La razón inversa hombre-mujer solo se observó en América Central, en el grupo de 10 a 19 años. En las personas de 60 años o más y, particularmente, en las de 70 años o más, se observó la mayor razón hombre-mujer de suicidios, con pocas excepciones en el análisis por subregiones.

III. Edad y suicidio

La mayoría de los suicidios en la Región,

38,4%, se producían en edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, y entre los 45 y los 59 años, 23,4%. Entre las personas de 60 años o más, solo se producían el 18,6% de los suicidios, sin embargo, las personas de 70 años o mayores presentaban una tasa de suicidio de 13,9 por 100.000, la más elevada entre los diferentes grupos de edad (Cuadro 3.1). Cuando se analizaron las tasas específicas según el sexo se observó que el mayor riesgo de suicidio de las personas de 70 años o mayores solo existía entre los hombres. Entre las mujeres, el riesgo de suicidio aumentaba con la edad y llegaba a un máximo entre los 45 y los 59 años, posteriormente disminuía.

En América del Norte, las personas de 45 a 59 años presentaban mayores tasas de suicidio que las de otros grupos durante los años 2000 al 2004. En América Central, el intervalo de edad con la tasa más alta de suicidio era el de 20 a 24 años, mientras que en el Caribe no latino las edades con mayor riesgo eran las comprendidas entre 25 y 44 años. En los hombres, los mayores de 70 años tenían las tasas más elevadas, con la excepción de Centroamérica y el Caribe no latino, donde las tasas más elevadas se observaban entre los 20 y 24 y los 25 y 44 años, respectivamente. La edad de mayor riesgo era más variable entre las mujeres. En América del Norte era la de 45 a 59 años, en América Central, el Caribe no latino y América del Sur la de 20 a 24 años, y en el Caribe latino la de 70 años o más (Cuadro 3.1).

En el Cuadro 3.2, se muestran las tasas por grupos de edad observadas durante los años 2000 al 2004 en los ocho países seleccionados. Los hombres mayores de 70 años constituyán el grupo con más alto riesgo en la mayoría de los países: Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos y Uruguay. En Canadá, el mayor riesgo se observaba entre los 45 y 59 años, y en México y Nicaragua, la edad con una tasa más elevada de suicidios en hombres era la de 20 a 24 años. Para ambos sexos conjuntamente, la edad con mayor

riesgo de suicidio era la misma que la de los hombres, con la excepción de Brasil, donde el mayor riesgo no se observaba en el grupo de mayor edad sino en el de edades comprendidas entre 45 y 59 años. En las mujeres, con la excepción de Cuba, las tasas de suicidio eran más elevadas entre las jóvenes y las de mediana edad. Sin embargo, lo más relevante eran las elevadas tasas de suicidio en las mujeres de 10 a 19 años y de 20 a 24 años de edad. Las mujeres nicaragüenses de 10 a 19 años presentaban tasas aun mayores que sus homólogos masculinos. En México y Centroamérica, el suicidio constituye un preocupante problema de salud pública, particularmente en las poblaciones más jóvenes.

IV. Métodos de suicidio

Las armas de fuego, la asfixia y el envenenamiento fueron los principales mecanismos utilizados a nivel regional, aunque variaban según la subregión, tal como se muestra en el Cuadro 4.1 y en la Figura 2. En América del Norte, se observó la proporción más alta de muertes autoinfligidas por armas de fuego entre todas las subregiones. En el Caribe latino se daban con mayor frecuencia los suicidios por asfixia, por envenenamiento y por fuego o llamas; mientras que América del Sur mostraba la proporción más alta de defunciones por envenenamiento.

De manera análoga, en los ocho países examinados, el envenenamiento, las armas de fuego y la asfixia fueron los tres métodos de suicidio más frecuentemente utilizados, con un orden variable. Generalmente, casi todos los otros métodos se emplearon en menos del 3% de los casos. En los Estados Unidos, las defunciones por armas de fuego representaban más de la mitad de los suicidios, 54,2%. A continuación, aparecían los casos de asfixia, 20,8%, y los envenenamientos, 17,3% (Cuadro 4.1). En Canadá, la asfixia, 43,0%, fue el método más usado, seguida

del envenenamiento, 25,1% y las armas de fuego, 17,2%. También en Canadá, el salto desde un lugar elevado como método de suicidio fue más frecuente, 5,0%, que en otros países. En Chile, el 75,9% de los suicidios se produjeron por asfixia y el 10,9% por armas de fuego. Los envenenamientos representaban aproximadamente el 7,6% de las defunciones. En Cuba, el principal método fue la asfixia, 63,8%. Otros dos métodos eran también muy prevalentes, la muerte por fuego o llamas, 14,0% y el envenenamiento, 13,7%. La muerte por armas de fuego solo representaba el 2,7% de los suicidios. En Nicaragua, el envenenamiento fue el principal factor contribuyente al suicidio, 70,0%, seguido de la asfixia, 21,5%, y las armas de fuego, 5,7%. En Uruguay, la asfixia, 45,4%, y las armas de fuego, 39,8%, fueron los principales contribuyentes. El envenenamiento, aunque era uno de los tres principales mecanismos, fue mucho menos utilizado que los otros dos métodos, 4,6%. La asfixia constituyó el 68,1% de los mecanismos empleados en México, mientras que las armas de fuego representaban el 17,7%, y el envenenamiento el 9,5%. En Brasil, se observó una categorización similar de los métodos de suicidio, en primer lugar la asfixia, 53,2%, en segundo lugar las armas de fuego, 17,5%, y en tercer lugar el envenenamiento, 15,0%.

El método elegido para el suicidio variaba según el sexo. En los hombres (Cuadro 4.2), el método de suicidio más utilizado generalmente en la Región, y en América del Norte en particular, fueron las armas de fuego. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, la asfixia fue más frecuente. El envenenamiento fue el principal método utilizado por los hombres en Centroamérica y en el Caribe no latino. En los ocho países examinados, la asfixia fue el principal método empleado por los hombres, con la excepción de Nicaragua y Estados Unidos donde predominaban el envenenamiento y las armas de fuego, respectivamente.

En las mujeres (Cuadro 4.3), el envenenamiento y la asfixia fueron los métodos de suicidio más utilizados. En el Caribe latino y no latino, generalmente las mujeres empleaban más la asfixia que el envenenamiento. Este último, en cambio, se utilizaba con mayor frecuencia en América del Norte, América Central y América del Sur.

En el Cuadro 4.4 se muestra la razón hombre-mujer correspondiente a los métodos de suicidio empleados en la Región. En todos los países, los hombres tenían una mayor propensión a emplear la asfixia, las armas de fuego y las armas blancas u objetos punzocortantes. Por otro lado, era más probable que las mujeres recurrieran al envenenamiento, al salto desde un lugar elevado, al ahogamiento, y al fuego o las llamas. La mayor discrepancia entre hombres y mujeres en cuanto al principal método de suicidio utilizado correspondía a las armas de fuego, ya que los hombres las utilizaban 1,8 veces más a menudo que las mujeres. Por otro lado, en comparación con los hombres, era 2,5 veces más probable que las mujeres emplearan el envenenamiento como método de suicidio, y 5,0 veces más probable que emplearan el fuego o las llamas.

Los métodos de suicidio también variaban según la edad y la subregión (Cuadro 4.5). En general, las personas menores de 59 años tenían más probabilidades de suicidarse mediante la asfixia, mientras que las mayores de 60 años empleaban preferentemente las armas de fuego. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, la asfixia era el método más empleado en todos los grupos de edad. En América del Norte, las armas de fuego eran un método común entre los diferentes grupos etarios, con la excepción de los adolescentes de 10 a 19 años, que utilizaban con mayor frecuencia la asfixia. En el Caribe no latino, el envenenamiento era el principal método de suicidio en todos los grupos de edad, así como América Central, con la excepción de

los adolescentes de 10 a 19 años. En América del Sur y el Caribe latino, la asfixia era el principal medio empleado por todos los grupos. También se observaba poca variación con la edad al considerar únicamente los suicidios en hombres (Cuadro 4.6); sin embargo, se observó mucha más variabilidad según la edad en cuanto al método utilizado entre las mujeres (Cuadro 4.7).

Cuando se examinaron los ocho países, el método empleado para el suicidio permanecía relativamente estable para ambos sexos conjuntamente en los distintos grupos de edad (Cuadro 4.8) y también en los hombres (Cuadro 4.9). Con pocas excepciones, las mujeres de los países seleccionados también mostraban uniformidad en cuanto al método usado en las distintas edades. Una excepción era Uruguay, donde las mujeres menores de 59 años empleaban principalmente las armas de fuego, mientras que las mayores utilizaban principalmente la asfixia (Cuadro 4.10).

V. Tendencias de las tasas de suicidio desde 1990

Empleando tasas ajustadas según la edad, el índice de suicidio en la Región de las Américas había permanecido relativamente estable durante el período de 15 años entre 1990 y el 2004. Sin embargo, se observaron cambios en algunas subregiones, por ejemplo, en América del Norte, donde hubo una ligera disminución de las tasas (Figura 3). Se advirtieron incrementos en las tasas de suicidio en América Latina y el Caribe en su conjunto, especialmente en el Caribe no latino. En el Caribe latino, las tasas de suicidio no se alteraron de forma apreciable basándose en los coeficientes de correlación de las tasas con el transcurso del tiempo (Cuadro 5.1). En el Cuadro 5.2 se muestra en detalle las tasas de todos los años no ajustadas según la edad, y en los Cuadros 5.3 y 5.4 las correspondientes a hombres y mujeres, respectivamente.

En cuanto a los países seleccionados, durante este período de quince años, las tasas de suicidio solo descendieron en Cuba y Estados Unidos. Se observó un incremento de las tasas en Brasil, México, Nicaragua y Uruguay.

En la mayor parte de las subregiones y países en que se produjeron cambios en las tasas de suicidio, estos iban en la misma dirección para ambos sexos, con resultados más pronunciados entre los hombres. En América del Norte, se observó una disminución de las tasas entre los hombres pero no hubo cambios significativos entre las mujeres (Cuadro 5.1).

Los cambios en las tasas de suicidio durante el período de 15 años fueron específicos para la edad. En términos generales, en la Región, las tasas se incrementaron entre los adolescentes de 10 a 19 años, así como en el grupo de edad de 45 a 59 años. Se observó una disminución de las tasas entre las personas de 24 a 44 años, y a partir de los 60 (Cuadro 5.5). Por subregiones, hubo un aumento del suicidio entre las personas de 10 a 19 años, salvo en América del Norte y el Caribe latino, donde disminuyó. En América Latina y el Caribe, se observó un aumento del suicidio en edades comprendidas entre los 10 y 44 años. En América del Norte, se observó una disminución en todos los grupos de edad, excepto en el de 45 a 59 años, que experimentó un aumento. En Centroamérica, se percibió un aumento del suicidio hasta los 70 años de edad. En el Caribe no latino, se observó un incremento con la edad, excepto en el grupo de **20 a 23 años**. En América del Sur, hubo un aumento del suicidio en las personas menores de 24 años y una disminución por encima de los 60.

En los ocho países seleccionados, los cambios en las tasas variaban según el grupo de edad. En la mayoría de ellos se produjo un aumento o una disminución de las tasas en las personas mayores de 60 años. En México y Nicaragua, y hasta cierto punto en Uruguay, se

observó un aumento constante del suicidio en casi todos los grupos de edad. En contraste, el suicidio se redujo en casi todos los grupos de edad en Cuba y los Estados Unidos.

VI. Validez y limitaciones de los datos

Es importante tener en cuenta la calidad de los datos de mortalidad por suicidio cuando se llevan a cabo comparaciones de las tasas entre países. El subregistro de las defunciones, las muertes de intención no determinada y las defunciones como consecuencia de eventos no especificados, constituyen mediciones objetivas incluidas en los datos de mortalidad que permiten apreciar su calidad y exactitud.

Los suicidios siempre representan una porción desconocida de estas defunciones no registradas y se observó que su porcentaje varía sustancialmente en toda la Región de la Américas. Es probable que en los países con un porcentaje mayor de defunciones no registradas, hubiera un mayor número de suicidios no incluidos en el cálculo de las tasas.

También es probable que las muertes clasificadas como de intención no determinada entre las causas externas contengan un alto porcentaje de suicidios mal diagnosticados o registrados erróneamente como "no determinados". Un alto porcentaje de defunciones no determinadas es indicativo de un mayor número de posibles suicidios no representados en las tasas correspondientes a ese país. Por consiguiente, con la excepción de América del Norte, las tasas de suicidio de las subregiones, particularmente las de Centroamérica, con un porcentaje de muertes de intención no determinada por encima del 5%, podrían ser muy superiores a las notificadas (Figura 4). En los ocho países seleccionados el porcentaje de defunciones de intención no determinada entre las causas externas era

inferior a 5%, lo que apoyó la decisión de escogerlos para el presente análisis.

En la Figura 5 se muestra el porcentaje de defunciones debidas a síntomas, signos y condiciones mal definidas. Un porcentaje pequeño de muertes debidas a síntomas, signos y condiciones mal definidas en el número total de defunciones, tal como se observa en la subregión de América del Norte, indica una notificación más exacta y completa de los datos de mortalidad. Si las defunciones por esta causa incluyeran casos de suicidios, ello podría alterar sustancialmente las tasas de suicidio de algunos países.

Aunque no se puedan corregir las estimaciones de las tasas de suicidio para subsanar el subregistro, los cálculos pueden ajustarse teniendo en cuenta las defunciones de intención no determinada. Para obtener los datos presentados en este informe, se realizó esta corrección. En el Cuadro 6.1 se muestran las diferencias porcentuales correspondientes a las Américas y a las distintas subregiones si se tienen en cuenta o no las defunciones de intención no determinada en el cálculo de las tasas de suicidio. Es así que se observó un aumento considerable de las mismas en Centroamérica y en el Caribe no latino.

Es posible que muchas de las defunciones debidas a enfermedades mentales representen suicidios no documentados. Aunque se esperaría que las enfermedades mentales fueran una causa poco común de muerte, la mayoría de las defunciones atribuidas a trastornos afectivos, trastornos de ansiedad y psicosis pueden ser consecuencia de suicidios. Dado que la demencia y otros trastornos orgánicos se incluyen en el capítulo V de la CIE-10, el análisis de las defunciones en edades comprendidas entre los 10 y 59 años permite estudiar las defunciones por enfermedades mentales sin incluir dichas condi-

ciones. Tal como se muestra en el Cuadro 6.2, las enfermedades mentales, especialmente en los hombres, eran una causa destacada de muerte, ocupando incluso el séptimo lugar en América Central. Una explicación exacta con respecto a este posicionamiento de este tipo de enfermedades requiere un análisis más detallado de las causas específicas de muerte; sin embargo, las defunciones relacionadas con el consumo de drogas, tales como las debidas a sobredosis o abstinencia, tal vez constituyan un factor importante.

También se puede clasificar de manera incorrecta a las otras causas externas de muerte, aunque en realidad correspondan a suicidios. Por ejemplo, puede ser difícil discernir si la muerte fue intencional o no en los accidentes automovilísticos, las caídas desde un lugar elevado y los ahogamientos.

En algunos países de la Región, todavía no se disponía de datos de todos los años. Por consiguiente, las tasas regionales y subregionales deben interpretarse con cierta cautela.

CONSIDERACIONES FINALES

La tasa corregida según la edad de suicidio en las Américas fue de 7,4 por 100.000 habitantes en el periodo 2000-2004; 11,9 para los hombres y 3,1 para las mujeres. Las tasas variaron considerablemente entre las diferentes subregiones del continente. Las más elevadas se observaron en el Caribe no latino y las más bajas, en México. El suicidio fue aproximadamente cuatro veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. Se observó que la edad era un importante factor de riesgo de suicidio. Las personas mayores de 70 años presentaban la tasa más elevada de toda la Región de las Américas, especialmente los hombres, aunque ello no era válido para algunas subregiones. El suicidio ocupó el tercer lugar entre las principales causas de muerte en las personas de 10 a 24 años.

Entre 1990 y el 2004, la tasa de suicidio en las Américas permaneció relativamente estable. En cambio, las tasas de algunas subregiones sí sufrieron variaciones. Se observó una ligera disminución en América del Norte y un aumento en América Latina y en el Caribe. El principal método de suicidio en la Región fue el uso de armas de fuego; sin embargo, en ello influía el desproporcionado número de defunciones por armas de fuego en América del Norte. En América Latina y el Caribe, el método predominante fue la asfixia. En Centroamérica y en el Caribe no latino, el envenenamiento fue el método más comúnmente empleado. El método variaba según el sexo, ya que los hombres empleaban más frecuentemente las armas de fuego y las mujeres el envenenamiento. La edad parecía influir poco en el método elegido.

Se ha observado una mejora en la disponibilidad de información en materia de suicidio en las Américas, ya que cada vez hay un mayor número de países que registran y proporcionan datos estadísticos confiables. La calidad de los datos provistos variaba según las subregiones, y es probable que en algunas de ellas las tasas de suicidio estuvieran subestimadas. Por ejemplo, cuando no se tenían en cuenta las defunciones por causas indeterminadas, existía una diferencia de 4,3% en las tasas de suicidio, pero en Centroamérica esta diferencia alcanzaba el 10,4%. Por otra parte, en América Latina y el Caribe, el porcentaje de defunciones debidas a síntomas, signos y condiciones mal definidas era de 8,3%, mientras que en América del Norte era de 1,3%.

Resulta evidente que el suicidio constituye un relevante problema de salud pública en la Región de las Américas, especialmente en América Latina y el Caribe, donde en muchos países las tasas siguen aumentando. Las ideaciones y los intentos de suicidio, también representan una gran parte de la carga que debe afrontar el sistema de salud pública. Es preciso obtener datos epidemiológicos sobre estos comportamientos que forman parte del espectro del suicidio, de los cuales se dispone de poca información. Las ideaciones y los intentos, a diferencia de lo que ocurre con el suicidio, se reportan en general más frecuentemente entre las mujeres que entre los hombres. Al igual que el suicidio, estos comportamientos están frecuentemente asociados con trastornos psiquiátricos. Por otra parte, una proporción considerable de personas que intentan suicidarse no acuden en busca de tratamiento. Por ejemplo, luego de un intento de suicidio, 53% de las personas en México (Borges y cols., 2007) y 79% en Estados Unidos (Kessler y cols., 2005) solicitaron algún tipo de tratamiento.

Finalmente, cabe destacar que el presente informe pretende ofrecer una visión general de la problemática del suicidio en la Región de las Américas sustentado en la base de datos de mortalidad de la OPS/OMS, que contiene la información oficial aportada por los países. Consideramos que por la dimensión y significación del tema, este requiere de investigaciones complementarias que nos permitan comprender mejor el comportamiento suicida en los diferentes contextos socio-culturales y determinar las formas apropiadas de intervención para su prevención y atención. No obstante, en la actualidad existen datos, como los aportados en este informe, además de un caudal adicional importante de trabajos científicos que nos proveen información para la acción. La OPS y los Estados Miembros del continente disponen de condiciones y voluntad para afrontar este relevante problema de salud pública en los próximos años.

B I B L I O G R A F Í A

- Bertolote JM, Fleischman A. A global perspective in the epidemiology of suicide. *Sociology* 2002;7:6-8.
- Bertolote JM, Fleischmann A, De Leo D, Bolhari J, Botega N, De Silva D, Tran Thi Thanh H, Phillips M, Schlebusch L, Värnik A, Vijayakumar L, Wasserman D. Suicide attempts, plans, and ideation in culturally diverse sites: the WHO SUPRE-MISS community survey. *Psychological Medicine* 2005;35:1457-1465.
- Borges G, Nock MK, Medina-Mora ME, Benjet C, Lara C, Chiu WT, Kessler RC. The epidemiology of suicide-related outcomes in Mexico. *Suicide and Life Threatening Behavior* 2007;37:627-640.
- Center for Disease Control and Prevention. *Suicide Facts at a Glance*. Atlanta, Center for Disease Control, mediados del 2008. http://www.cdc.gov/ncipc/dvp/Suicide/suicide_data_sheet.pdf
- Friedmann H, Kohn R. Mortality in the suicidal population. *Suicide and Life Threatening Behavior* 2008;38:287-301.
- Goldsmith SK, Pellmar TC, Kleinman AM, Bunney WE (eds). *Reducing Suicide: a National Imperative*. Washington DC, National Academy Press, 2002.
- Henriksson MH, Aro HA, Marttunen MJ, Heikkinen ME, Isometsä ET, Kuoppasalmi KI, Lönnqvist JK. Mental disorders and comorbidity in suicide. *American Journal of Psychiatry* 1993;150:935-940.
- Kessler RC, Berglund P, Borges G, Nock M, Wang PS. Trends in suicide ideation, plans, gestures, and attempts in the United States, 1990-1992 to 2001-2003. *Journal of the American Medical Association* 2005;293:2487-2495.
- Klieve H, Barnes M, De Leo D. Controlling firearms use in Australia: has the 1996 gun law reform produced the decrease in rates of suicide with this method? *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 2009;44:285-292.

- Leenars A. Gun availability and control in suicide prevention. En (Wasserman D, Wasserman C, eds.) Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention. Oxford, Oxford University Press; 2009.
- Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Medicine 2006;3:e442.
- Osborn D, Levy G, Nazareth I, King M. Suicide and severe mental illnesses. Cohort study within the UK general practice research database. Schizophrenia Research 2008;99:134-138.
- Pan American Health Organization. Health Statistics from the Americas: 2006 Edition. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud; 2006. (<http://www.paho.org/English/DD/AIS/HSA2006.htm>).
- Phillips MR. Suicide prevention in developing countries: where should we start? World Psychiatry 2004;3:156-157.
- Posada-Villa J, Rodríguez M, Duque P, Garzón A. Prevalencia y factores de riesgo de comportamientos relacionados con suicidio en el Estudio Nacional de Salud Mental, Colombia 2003 (ENSM). Nova Publicación Científica 2007;5:84-91.
- Rihmer Z. Suicide risk in mood disorders. Current Opinion Psychiatry 2007;20:17-22.
- Suicide Data. PAHO Regional Mortality and Population System. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud; 2008.
- Vijayakumar L, Nagaraj K, Pirkis J, Whiteford H. Suicide in developing countries (1): frequency, distribution, association with socioeconomic indicators. Crisis 2005;26:104-111.
- Wasserman D, Qi C, Guo-Xin J. Global suicide rates among young people aged 15-19. World Psychiatry 2005;4:114—120.
- Weissman MM, Bland RC, Canino GJ, Greenwald S, Hwu HG, Joyce PR, Karam EG, Lee CK, Lellouch J, Lepine JP, Newman SC, Rubio-Stipek M, Wells JE, Wickramaratne PJ, Wittchen HU, Yeh EK. Prevalence of suicide ideation and suicide attempts in nine countries. Psychological Medicine 1999;29:9-17.
- World Health Organization. The World Health Report 2001: Mental Health, New Understanding New Hope. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2001.
- World Health Organization. The World Health Report 2003: Shaping the Future. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2003.
- World Health Organization. The Global Burden of Disease: 2004 Update. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2008.

T A B L E S / C U A D R O S

Table 1.1. Suicide rates per 100,000 population in the subregions of the Americas and selected countries, unadjusted and age-adjusted rates, 2000 – 2004.
Cuadro 1.1. *Tasas de suicidio por 100.000 habitantes en las subregiones de las Américas y en determinados países, tasas no ajustadas y ajustadas según la edad, 2000 – 2004.*

Region / Country Región / País	Age-unadjusted Rates / Tasas no ajustadas según la edad			Age-adjusted Rates / Tasas ajustadas según la edad		
	Total	Males / Hombres	Females / Mujeres	Total	Males / Hombres	Females/ Mujeres
Americas / América	7.9	12.7	3.3	7.4	11.9	3.1
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	5.9	9.4	2.5	5.8	9.4	2.5
North America* / América del Norte*	11.1	18.0	4.5	9.5	15.3	3.8
Central America / América Central	7.3	10.8	3.8	7.5	11.4	3.9
Latin Caribbean / Caribe latino	8.4	12.9	3.9	7.6	11.7	3.7
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	14.1	22.4	6.0	13.4	21.7	5.7
South America* / América del Sur*	6.7	10.5	3.0	6.3	10.2	2.7
Brazil / Brasil	5.2	8.2	2.2	5.3	8.5	2.3
Canada / Canadá	12.3	19.1	5.6	10.4	16.0	4.8
Chile	10.5	18.1	3.1	9.8	17.2	2.9
Cuba	16.4	23.6	9.1	13.0	18.5	7.8
Nicaragua	13.7	19.2	8.2	14.1	20.5	8.0
Mexico / México	4.6	7.8	1.5	4.4	7.7	1.4
United States / Estados Unidos	11.0	17.8	4.4	9.5	15.3	3.7
Uruguay	16.0	26.6	6.1	13.6	23.1	5.4

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 1.2. Ranking and percent contribution (in parentheses) of suicide among other causes of death in the subregions of the Americas, by sex and age, 2000 – 2004.

Cuadro 1.2. *Orden de importancia y porcentaje (entre paréntesis) de la contribución del suicidio entre otras causas de muerte en las subregiones de las Américas, por sexo y edad, 2000-2004.*

Region / Región	Age / Edad							
	5 - 9	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+	Total
Total								
Americas / América	49 (0.1)	3 (6.4)	3 (7.3)	5 (5.2)	16 (2.0)	30 (0.7)	39 (0.2)	27 (1.2)
Latin America and the Caribbean								
/ América Latina y el Caribe	47 (0.1)	4 (5.0)	4 (5.3)	9 (3.2)	26 (1.2)	37 (0.5)	45 (0.2)	31 (1.0)
North America* / América del Norte*	42 (0.2)	3 (11.1)	3 (14.6)	2 (9.4)	10 (3.0)	27 (0.8)	36 (0.3)	23 (1.3)
Central America / América Central	...	3 (10.5)	3 (10.2)	4 (5.2)	19 (1.9)	32 (0.6)	44 (0.2)	21 (1.8)
Latin Caribbean / Caribe latino	58 (0.04)	6 (3.4)	5 (4.7)	6 (5.2)	13 (2.4)	26 (1.2)	32 (0.5)	26 (1.4)
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	30 (0.9)	4 (9.2)	4 (10.8)	4 (6.2)	16 (2.1)	31 (0.7)	32 (0.2)	18 (1.6)
South America* / América del Sur*	47 (0.1)	4 (6.4)	6 (6.2)	6 (3.7)	23 (1.5)	33 (0.6)	43 (0.2)	29 (1.1)
Males / Hombres								
Americas / América	43 (0.2)	2 (6.3)	2 (7.7)	4 (6.0)	13 (2.5)	28 (0.9)	35 (0.4)	21 (1.7)
Latin America and the Caribbean								
/ América Latina y el Caribe	45 (0.1)	5 (4.5)	4 (5.4)	7 (2.1)	22 (1.6)	32 (0.7)	39 (0.3)	26 (1.4)
North America* / América del Norte*	36 (0.3)	3 (12.9)	3 (15.5)	2 (11.4)	6 (3.7)	24 (1.1)	32 (0.5)	13 (2.1)
Central America / América Central	...	4 (8.4)	3 (10.0)	4 (6.0)	14 (2.6)	26 (1.0)	19 (0.3)	12 (2.4)
Latin Caribbean / Caribe latino	...	7 (4.4)	5 (5.1)	5 (6.3)	11(3.0)	20 (1.5)	28 (0.8)	19 (1.9)
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	22 (1.0)	3 (8.3)	3 (11.6)	4 (7.8)	13 (2.8)	27 (1.0)	35 (0.4)	14 (2.4)
South America* / América del Sur*	45 (0.2)	4 (5.5)	4 (6.2)	5 (4.3)	17 (2.0)	31 (0.9)	37 (0.4)	22 (1.6)
Females / Mujeres								
Americas / América	54 (0.1)	3 (6.5)	3 (5.7)	10 (3.3)	27 (1.2)	39 (0.3)	47 (0.1)	38 (0.5)
Latin America and the Caribbean								
/ América Latina y el Caribe	52 (0.1)	4 (6.4)	5 (4.9)	20 (2.0)	36 (0.6)	45 (0.2)	49 (0.1)	43 (0.5)
North America* / América del Norte*	53 (0.03)	2 (7.0)	3 (7.7)	4 (5.5)	17 (1.9)	35 (0.4)	44 (0.1)	33 (0.5)
Central America / América Central	...	1 (14.8)	1 (11.1)	12 (3.3)	33 (0.7)	44 (0.2)	49 (0.03)	28 (1.0)
Latin Caribbean / Caribe latino	52 (0.1)	9 (3.5)	8 (3.4)	11 (3.2)	23 (1.5)	29 (0.7)	42 (0.2)	36 (0.7)
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	25 (0.8)	1 (10.8)	2 (9.1)	7 (3.1)	29 (0.9)	38 (0.4)	43 (0.1)	32 (0.8)
South America* / América del Sur*	48 (0.1)	2 (8.4)	4 (6.1)	14 (2.3)	33 (0.8)	40 (0.3)	48 (0.1)	41 (0.6)

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.
Nota/Note: (...) =Suicide too rare to rank. El suicidio era demasiado poco frecuente para poder clasificarlo.

Table 1.3. Ranking and percent contribution (in parentheses) of suicide, among other causes of death, in selected countries, by sex and age, 2000 – 2004.

Cuadro 1.3. Orden de importancia y porcentaje (entre paréntesis) de la contribución del suicidio entre otras causas de muerte en determinados países, por sexo y edad, 2000-2004.

Region / Región	Age / Edad							
	5 - 9	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+	Total
Total								
Brazil / Brasil	48 (0.1)	7 (2.9)	5 (3.5)	9 (2.5)	26 (1.0)	41 (0.4)	45 (0.1)	30 (0.8)
Canada / Canadá	...	2 (19.1)	2 (22.8)	1 (16.0)	6 (4.7)	14 (1.0)	40 (0.2)	21 (1.6)
Chile	32 (0.2)	2 (13.5)	2 (18.8)	2 (10.8)	9 (3.3)	30 (1.0)	39 (0.3)	20 (2.0)
Cuba	...	3 (7.3)	3 (12.6)	2 (10.4)	6 (3.6)	17 (1.7)	26 (0.7)	15 (2.0)
Mexico / México	43 (0.1)	5 (6.0)	4 (6.8)	8 (3.0)	30 (0.8)	43 (0.3)	47 (0.1)	32 (0.9)
Nicaragua	...	1 (14.9)	2 (16.4)	4 (6.8)	16 (1.9)	30 (0.6)	42 (0.2)	15 (2.5)
United States / Estados Unidos	40 (0.2)	3 (10.5)	3 (12.9)	2 (8.9)	10 (2.9)	27 (0.8)	36 (0.3)	25 (1.3)
Uruguay	32 (0.4)	3 (10.7)	1 (20.8)	1 (10.5)	8 (4.1)	22 (1.5)	33 (0.5)	23 (1.7)
Males / Hombres								
Brazil / Brasil	44 (0.1)	6 (2.5)	5 (3.5)	9 (2.8)	23 (1.2)	25 (0.5)	41 (0.2)	26 (1.1)
Canada / Canadá	...	2 (20.8)	2 (25.3)	1 (19.5)	5 (5.7)	21 (1.2)	35 (0.3)	12 (2.5)
Chile	32 (0.3)	2 (14.6)	1 (20.7)	2 (12.8)	7 (4.4)	22 (1.4)	33 (0.5)	10 (3.1)
Cuba	...	5 (6.4)	2 (13.4)	2 (12.3)	6 (4.4)	14 (2.0)	19 (1.1)	10 (2.7)
Mexico / México	40 (0.2)	4 (6.2)	4 (7.8)	8 (3.7)	21 (1.1)	35 (0.5)	40 (0.2)	26 (1.3)
Nicaragua	...	3 (12.3)	2 (16.6)	4 (8.0)	12 (2.5)	22 (1.0)	32 (0.3)	11 (3.2)
United States / Estados Unidos	35 (0.3)	3 (12.4)	3 (14.8)	2 (10.9)	7 (3.6)	23 (1.1)	30 (0.5)	14 (2.1)
Uruguay	...	3 (11.1)	1 (23.0)	1 (12.8)	7 (4.8)	18 (1.8)	23 (1.0)	12 (2.5)
Females / Mujeres								
Brazil / Brasil	...	8 (3.9)	7 (3.7)	20 (1.8)	35 (0.5)	46 (0.2)	48 (0.04)	45 (0.4)
Canada / Canadá	...	2 (15.5)	2 (16.1)	2 (9.7)	10 (3.0)	29 (0.6)	46 (0.1)	20 (0.8)
Chile	34 (0.2)	3 (10.9)	2 (12.1)	5 (5.6)	24 (1.3)	36 (0.3)	45 (0.1)	34 (0.6)
Cuba	...	2 (9.1)	2 (10.9)	2 (7.1)	14 (2.4)	20 (1.2)	34 (0.3)	22 (1.2)
Mexico / México	49 (0.04)	4 (5.4)	6 (4.0)	24 (1.4)	42 (0.3)	46 (0.1)	52 (0.02)	45 (0.3)
Nicaragua	...	1 (19.4)	1 (15.9)	5 (4.3)	24 (1.0)	38 (0.2)	46 (0.04)	19 (1.7)
United States / Estados Unidos	53 (0.03)	3 (6.3)	3 (7.1)	4 (5.2)	18 (1.8)	33 (0.4)	42 (0.07)	32 (0.5)
Uruguay	17 (1.0)	3 (9.9)	1 (13.5)	3 (6.3)	10 (2.8)	29 (0.9)	38 (0.2)	29 (0.7)

Nota/Note: (...) = Suicide too rare to rank. El suicidio era demasiado poco frecuente para poder clasificarlo.

Table 1.4. Percent contribution of suicide among external causes of death in the subregions of the Americas, by sex and age, 2000 – 2004.

Cuadro 1.4. Porcentaje de contribución del suicidio entre las causas externas de muerte en las subregiones de las Américas, por sexo y edad, 2000-2004.

Region / Región	Age / Edad						
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+	Total
Total							
Americas / América	10.1	10.3	13.2	17.6	15.6	9.3	12.0
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	8.2	7.7	8.1	10.3	10.4	6.9	7.7
North America* / América del Norte*	15.6	18.2	24.0	27.1	23.5	11.0	19.7
Central America / América Central	17.6	15.8	13.4	12.9	9.1	4.7	7.8
Latin Caribbean / Caribe latino	6.7	7.8	15.3	23.4	24.8	12.0	15.4
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	18.3	30.0	22.0	21.2	16.4	9.7	21.0
South America* / América del Sur*	10.3	8.6	8.0	10.9	12.1	8.8	8.5
Males / Hombres							
Americas / América	8.8	9.8	12.6	17.2	16.9	14.4	12.3
Latin America and the Caribbean							
América Latina y el Caribe	6.3	6.9	7.6	9.8	10.9	9.8	7.6
North America* / América del Norte*	17.1	19.3	25.2	28.3	27.4	18.4	22.9
Central America / América Central	12.2	13.6	12.6	12.9	10.0	6.5	7.3
Latin Caribbean / Caribe latino	5.5	7.1	14.3	21.6	24.7	19.6	16.1
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	14.1	17.6	21.5	21.9	16.5	13.7	20.9
South America* / América del Sur*	7.8	7.7	7.4	10.6	12.8	12.2	8.1
Females / Mujeres							
Americas / América	14.7	13.9	16.4	19.1	11.8	3.1	10.8
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	16.3	14.2	12.5	12.7	8.4	2.7	7.7
North America* / América del Norte*	11.5	13.4	20.4	23.8	15.2	3.4	12.7
Central America / América Central	35.2	31.6	19.8	12.8	5.4	1.3	10.3
Latin Caribbean / Caribe latino	11.0	12.3	21.1	31.4	25.0	4.6	13.6
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	32.6	30.9	25.2	18.2	16.2	4.7	21.4
South America* / América del Sur*	20.5	15.9	12.5	13.0	9.6	3.4	10.1

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 1.5. Percent contribution of suicide among external causes of death in selected countries, by sex and age, 2000 – 2004.
Cuadro 1.5. *Porcentaje de contribución del suicidio entre las causas externas de muerte en determinados países, por sexo y edad, 2000-2004.*

Region / Región	Age / Edad						
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+	Total
Total							
Brazil / Brasil	4.4	5.0	6.7	9.4	9.2	5.5	6.1
Canada / Canadá	28.0	32.2	39.1	40.2	28.1	7.1	26.8
Chile	24.0	27.3	26.6	24.1	17.8	10.1	21.5
Cuba	13.9	21.3	27.9	35.9	34.9	13.1	22.8
Mexico / México	11.2	11.8	9.0	6.8	5.6	3.6	7.5
Nicaragua	26.5	27.6	19.8	16.3	11.4	5.6	18.6
United States / Estados Unidos	14.7	17.3	22.9	26.0	23.1	11.5	19.1
Uruguay	19.0	31.8	30.4	38.6	35.0	22.2	27.6
Males / Hombres							
Brazil / Brasil	3.4	4.4	6.0	8.8	9.7	7.9	5.8
Canada / Canadá	28.5	33.3	39.9	40.8	30.3	12.4	31.5
Chile	23.2	26.9	25.9	23.9	18.7	15.3	22.7
Cuba	11.1	19.9	26.3	32.9	34.7	22.7	25.7
Mexico / México	10.0	11.6	6.9	6.2	5.3	3.7	7.9
Nicaragua	18.7	23.4	18.2	15.0	12.4	7.8	16.6
United States / Estados Unidos	16.3	18.5	24.1	27.3	27.1	19.0	22.2
Uruguay	17.2	31.9	29.9	37.5	35.8	33.3	30.6
Females / Mujeres							
Brazil / Brasil	9.7	10.7	12.0	12.7	7.3	2.4	8.2
Canada / Canadá	26.8	28.3	36.5	38.6	23.0	2.6	17.8
Chile	26.9	30.1	31.9	25.2	13.4	2.8	16.6
Cuba	21.5	26.2	34.2	46.8	35.3	5.1	17.4
Mexico / México	15.4	23.1	9.3	6.8	3.6	0.8	6.1
Nicaragua	48.9	50.2	30.8	24.7	6.9	1.7	26.5
United States / Estados Unidos	10.4	12.3	19.3	22.6	14.5	3.5	12.3
Uruguay	24.8	31.5	32.2	42.4	32.1	7.9	19.6

Table 2.1. Male to female ratio of suicide, by age group, in the subregions of the Americas and in selected countries, 2000 – 2004.

Cuadro 2.1. Razón hombre-mujer de suicidios, por grupos de edad, en las subregiones de las Américas y en determinados países, 2000-2004.

Region / Country	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+	Age-adjusted / Ajustado según la edad Total	Age-unadjusted / No ajustado según la edad Total
Americas / América	2.1	4.3	4.0	3.5	4.7	7.9	3.8	3.9
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	1.5	3.7	4.4	4.3	5.3	6.9	3.8	3.7
North America* / América del Norte*	3.8	5.8	3.8	3.2	4.3	8.4	4.0	4.0
Central America / América Central	0.9	2.1	3.8	5.3	6.8	10.8	2.9	2.8
Latin Caribbean / Caribe latino	1.3	2.6	3.2	3.1	3.3	4.7	3.2	3.3
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	1.3	2.1	4.9	8.1	3.3	5.0	3.8	3.5
South America* / América del Sur*	1.4	3.6	4.3	4.5	6.0	8.2	3.8	3.7
Brazil / Brasil	1.7	3.8	4.0	4.0	5.1	5.6	3.7	3.8
Canada / Canadá	2.7	4.0	3.6	2.9	3.2	5.9	3.3	3.4
Chile	3.0	6.2	5.9	6.5	8.5	11.5	5.9	5.9
Cuba	1.1	1.7	2.4	2.4	2.4	4.1	2.4	2.6
Mexico / México	2.4	6.0	6.9	6.2	7.9	14.0	5.5	5.2
Nicaragua	0.9	2.2	3.6	3.5	8.2	8.6	2.6	2.3
United States / Estados Unidos	4.2	6.1	3.8	3.2	4.4	8.8	4.1	4.1
Uruguay	2.0	5.4	4.3	3.4	5.4	9.3	4.3	4.3

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 3.1. Suicide rates per 100,000 population, by age group, in the subregions of the Americas, 2000 – 2004.

Cuadro 3.1. Tasas de suicidio por 100.000 habitantes, por grupos de edad, en las subregiones de las Américas, 2000-2004.

Region / Región	Age / Edad						
	5 - 9	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Total							
Americas / América	0.0	4.0	10.1	10.4	12.0	10.6	13.9
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	0.0	3.8	8.9	8.0	8.4	9.0	11.6
North America* / América del Norte*	0.0	4.6	12.8	14.4	15.8	12.3	15.6
Central America / América Central	0.1	6.6	14.3	10.8	9.5	8.4	9.2
Latin Caribbean / Caribe Latino	0.0	2.1	6.0	9.6	12.4	16.7	29.8
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	0.3	7.4	19.6	22.2	19.2	17.1	16.4
South America* / América del Sur*	0.1	4.7	10.2	7.6	8.9	10.7	13.6
Males / Hombres							
Americas / América	0.1	5.4	16.4	16.8	19.0	18.2	28.5
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	0.1	4.6	14.0	13.1	13.9	15.8	22.7
North America* / América del Norte*	0.0	7.3	21.6	22.6	24.3	20.6	32.9
Central America / América Central	0.1	6.3	19.5	17.4	16.3	15.0	18.3
Latin Caribbean / Caribe Latino	0.0	2.4	8.7	14.6	19.0	26.1	51.9
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	0.2	8.3	26.8	37.1	35.0	27.2	30.5
South America* / América del Sur*	0.1	5.6	16.0	12.4	14.9	19.2	27.9
Females / Mujeres							
Americas / América	0.0	2.6	3.8	4.2	5.4	3.9	3.6
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	0.0	3.0	3.8	3.0	3.2	3.0	3.3
North America* / América del Norte*	0.0	1.9	3.7	6.0	7.7	4.8	3.9
Central America / América Central	0.0	7.0	9.1	4.6	3.1	2.2	1.7
Latin Caribbean / Caribe Latino	0.0	1.9	3.4	4.6	6.2	7.9	11.1
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	0.4	6.4	12.5	7.6	4.3	8.3	6.1
South America* / América del Sur*	0.0	3.9	4.4	2.9	3.3	3.2	3.4

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 3.2. Suicide rates per 100,000 population, by age group, in selected countries, 2000 – 2004.
Cuadro 3.2. *Tasas de suicidio por 100.000 habitantes, por grupos de edad, en determinados países, 2000-2004.*

Region / Región	Age / Edad						
	5 - 9	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Total							
Brazil / Brasil	0.0	2.6	7.2	8.1	8.5	7.6	7.8
Canada / Canadá	0.0	6.0	14.3	16.1	18.0	12.1	10.5
Chile	0.0	4.8	15.6	14.5	15.4	14.4	15.6
Cuba	0.0	4.5	13.8	16.3	19.9	26.9	49.1
Mexico / México	0.1	3.6	8.6	6.6	5.0	5.2	6.6
Nicaragua	0.0	14.6	30.8	20.5	15.4	12.8	12.0
United States/ Estados Unidos	0.0	4.5	12.7	14.2	15.6	12.3	16.1
Uruguay	0.1	5.0	19.3	15.5	25.3	27.1	36.1
Males / Hombres							
Brazil / Brasil	0.0	3.2	11.3	13.2	13.9	13.3	14.6
Canada / Canadá	0.0	8.6	22.6	25.0	26.9	18.7	20.6
Chile	0.1	7.1	26.5	24.7	27.1	27.3	34.6
Cuba	0.1	4.7	17.2	23.1	28.5	38.3	82.3
Mexico / México	0.1	5.1	15.0	11.8	8.7	9.5	14.0
Nicaragua	0.0	13.8	42.6	32.6	24.1	23.0	23.3
United States/ Estados Unidos	0.0	7.1	21.5	22.4	24.0	20.8	34.3
Uruguay	0.0	6.7	32.3	25.4	40.1	49.1	81.1
Females / Mujeres							
Brazil / Brasil	0.0	1.9	3.0	3.3	3.5	2.6	2.6
Canada / Canadá	0.0	3.2	5.6	7.0	9.2	5.8	3.5
Chile	0.0	2.4	4.3	4.2	4.2	3.2	3.0
Cuba	0.0	4.3	10.2	9.5	11.7	16.0	20.2
Mexico / México	0.0	2.1	2.5	1.7	1.4	1.2	1.0
Nicaragua	0.0	15.4	19.2	9.1	6.8	2.8	2.7
United States/ Estados Unidos	0.0	1.7	3.5	5.9	7.5	4.7	3.9
Uruguay	0.3	3.3	6.0	5.9	11.7	9.1	8.7

Table 4.1. Methods used in suicide in the subregions of the Americas and in selected countries, percent of total for both sexes, 2000-2004.

Cuadro 4.1. Métodos de suicidio utilizados en las subregiones de las Américas y en determinados países, porcentaje del total para ambos sexos, 2000-2004.

Región / País	Suffocation Asfixia	Poisoning Envenenamiento	Fall Precipitación desde un lugar elevado	Firearms Armas de fuego	Fire/Flame Fuego/Llamas	Drowning / Ahogamiento	Cut/Pierce Corte/ Punción	Other / Otros
Americas / América	35.4	18.2	2.3	37.3	1.0	1.2	1.5	3.0
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	52.7	18.5	2.1	18.8	1.7	1.1	1.3	3.9
North America* / América del Norte*	23.2	18.1	2.5	50.3	0.5	1.3	1.7	2.4
Central America / América Central	25.2	63.5	0.9	8.7	0.3	0.3	0.7	0.5
Latin Caribbean / Caribe latino	62.0	14.4	2.4	6.4	10.4	0.9	1.5	2.0
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	49.1	17.9	2.3	24.4	0.7	1.2	1.1	3.2
South America* / América del Sur*	26.3	65.8	0.2	2.4	2.6	0.6	0.4	1.6
Brazil / Brasil	53.2	15.0	2.7	17.5	2.0	1.3	1.6	6.7
Canada / Canadá	43.0	25.1	5.0	17.2	0.7	2.8	2.4	4.0
Chile	75.9	7.6	1.0	10.9	1.0	0.8	0.9	1.9
Cuba	63.8	13.7	2.2	2.7	14.0	0.8	1.6	1.2
Mexico / México	68.1	9.5	0.8	17.7	0.2	0.5	1.2	2.0
Nicaragua	21.5	70.0	0.2	5.7	0.2	0.4	0.7	1.4
United States/ Estados Unidos	20.8	17.3	2.2	54.2	0.5	1.1	1.4	2.2
Uruguay	45.4	4.6	2.3	39.8	0.9	3.7	1.7	1.9

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 4.2. Methods used in suicide in the subregions of the Americas and in selected countries, percent for males, 2000-2004.

Cuadro 4.2. Métodos de suicidio utilizados en las subregiones de las Américas y en determinados países, porcentaje en hombres, 2000-2004.

Región / País	Suffocation Asfixia	Poisoning Envenenamiento	Fall Precipitación desde un lugar elevado	Firearms Armas de fuego	Fire/Flame Fuego/Llamas	Drowning / Ahogamiento	Cut/Pierce Corte/ Punción	Other / Otros
Americas / América	37.4	13.6	2.0	41.1	0.6	0.9	1.6	2.8
Latin America and the Caribbean /								
América Latina y el Caribe	56.6	14.4	1.7	20.9	0.7	0.8	1.3	3.5
North America* / América del Norte*	24.0	13.0	2.2	55.4	0.5	1.0	1.8	2.3
Central America / América Central	29.5	57.3	0.9	10.4	0.3	0.3	0.8	0.5
Latin Caribbean / Caribe latino	71.5	11.4	2.1	7.7	2.6	0.9	1.7	2.2
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	52.3	13.4	1.8	27.1	0.5	1.0	1.2	2.7
South America* / América del Sur*	29.2	64.3	0.2	2.9	0.6	0.6	0.5	1.7
Brazil / Brasil	56.7	11.7	2.2	19.4	1.0	1.0	1.6	6.3
Canada / Canadá	45.0	20.1	4.6	21.2	0.5	2.3	2.5	3.8
Chile	77.9	5.8	0.8	11.5	1.0	0.5	0.8	1.7
Cuba	76.8	10.7	2.0	3.4	3.2	0.6	1.9	1.4
Mexico / México	70.8	6.0	0.6	19.0	0.1	0.5	1.3	1.8
Nicaragua	27.5	62.4	0.2	6.9	0.1	0.5	1.0	1.4
United States / Estados Unidos	21.6	12.2	1.9	59.3	0.5	0.9	1.7	1.9
Uruguay	47.9	3.0	0.9	41.6	0.7	2.8	1.4	1.7

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 4.3. Methods used in suicide in the subregions of the Americas and in selected countries, percent for females, 2000-2004.

Cuadro 4.3. Métodos de suicidio utilizados en las subregiones de las Américas y en determinados países, porcentaje en mujeres, 2000-2004.

Región / País	Suffocation Asfixia	Poisoning Envenenamiento	Fall Precipitación desde un lugar elevado	Firearms Armas de fuego	Fire/Flame Fuego/Llamas	Drowning / Ahogamiento	Cut/Pierce Corte/ Punción	Other / Otros
Americas / América	27.5	36.5	3.7	22.4	2.7	2.1	1.3	3.8
Latin America and the Caribbean /								
América Latina y el Caribe	37.8	34.2	3.7	10.9	5.5	1.8	1.0	5.1
North America* / América del Norte*	20.0	38.2	3.6	30.6	0.8	2.4	1.6	2.9
Central America / América Central	11.4	83.5	0.8	3.2	0.3	0.1	0.2	0.5
Latin Caribbean / Caribe latino	29.6	24.4	3.4	1.9	37.2	1.2	1.0	1.4
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	37.3	34.8	4.3	14.5	1.2	2.2	1.0	4.7
South America* / América del Sur*	15.5	71.5	0.3	0.6	10.2	0.6	0.0	1.2
Brazil / Brasil	39.6	27.8	4.5	10.2	5.8	2.4	1.3	8.5
Canada / Canadá	36.2	41.9	6.3	3.6	1.1	4.3	2.0	4.6
Chile	64.6	17.7	2.3	7.7	1.3	2.3	1.0	3.1
Cuba	27.4	22.0	3.0	0.7	44.1	1.3	0.8	0.7
Mexico / México	54.8	26.9	1.7	11.4	0.6	0.7	0.8	3.2
Nicaragua	6.7	89.2	0.0	2.6	0.2	0.2	0.2	0.9
United States / Estados Unidos	17.9	37.7	3.3	34.2	0.7	2.1	1.5	2.6
Uruguay	35.1	11.2	7.7	32.3	1.6	7.3	1.6	3.2

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 4.4. Male to female ratio of methods used in suicide by subregions of the Americas and in selected countries, age-unadjusted, 2000-2004.

Cuadro 4.4. Razón hombre-mujer según los métodos de suicidio utilizados en las subregiones de las Américas y en determinados países, no ajustada según la edad, 2000-2004.

Región / País	Suffocation Asfixia	Poisoning Envenenamiento	Fall Precipitación desde un lugar elevado	Firearms Armas de fuego	Fire/Flame Fuego/Llamas	Drowning / Ahogamiento	Cut/Pierce Corte/ Punción
Americas / América	1.4	0.4	0.5	1.8	0.2	0.4	1.2
Latin America and the Caribbean /							
América Latina y el Caribe	1.5	0.4	0.5	1.9	0.1	0.5	1.3
North America* / América del Norte*	1.2	0.3	0.6	1.8	0.6	0.4	1.1
Central America / América Central	2.6	0.7	1.1	3.2	1.0	2.5	4.1
Latin Caribbean / Caribe latino	2.4	0.5	0.6	4.0	0.1	0.7	1.8
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	1.4	0.4	0.4	1.9	0.4	0.5	1.1
South America* / América del Sur*	1.9	0.9	0.5	4.7	0.1	0.9	5.0
<hr/>							
Brazil / Brasil	1.4	0.4	0.5	1.9	0.2	0.4	1.3
Canada / Canadá	1.2	0.5	0.7	5.9	0.5	0.5	1.3
Chile	1.2	0.3	0.3	1.5	0.7	0.2	0.8
Cuba	2.8	0.5	0.6	4.6	0.1	0.5	2.5
Mexico / México	1.3	0.2	0.4	1.7	0.2	0.7	1.6
Nicaragua	4.1	0.7	-	2.7	0.5	2.5	5.0
United States / Estados Unidos	1.2	0.3	0.6	1.7	0.7	0.4	1.1
Uruguay	1.4	0.3	0.1	1.3	0.4	0.4	0.9

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.
Note/Nota: (-) = Data was not available. No se disponía de datos.

Table 4.5. Methods used in suicide by age and subregions of the Americas, percent of total for both sexes, 2000-2004.

Cuadro 4.5. Métodos de suicidio utilizados según la edad y las subregiones de las Américas, porcentaje del total para ambos sexos, 2000-2004.

Region / Región	Age / Edad					
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Americas / América						
Suffocation / Asfixia	75.0	47.1	43.0	38.5	29.5	28.8
Poisoning / Envenenamiento	9.3	18.4	15.6	19.8	22.0	14.2
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.9	1.8	2.5	2.4	2.4	2.2
Firearms / Armas de Fuego	8.3	28.7	33.5	32.4	38.5	47.1
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.5	0.7	1.1	1.2	1.3
Drowning / Ahogamiento	1.9	0.6	0.8	1.1	1.3	1.7
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.3	0.8	1.5	2.1	1.8
Other / Otros	4.6	2.7	3.1	3.2	3.1	2.8
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe						
Suffocation / Asfixia	70.7	49.6	51.2	53.5	53.4	53.1
Poisoning / Envenenamiento	12.2	26.0	20.8	19.0	16.6	12.9
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	1.2	1.4	2.0	2.0	2.6	2.2
Firearms / Armas de Fuego	9.8	18.7	20.6	17.5	17.7	21.2
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.6	0.9	1.8	2.2	2.5
Drowning / Ahogamiento	1.2	0.6	0.7	0.9	1.3	1.7
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.3	0.8	1.3	1.7	1.7
Other / Otros	4.9	2.7	3.2	3.9	4.5	4.6
North America* / América del Norte*						
Suffocation / Asfixia	88.5	43.2	32.7	27.7	18.1	13.0
Poisoning / Envenenamiento	0.0	7.0	9.2	20.4	24.5	15.1
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	2.3	3.1	2.6	2.2	2.2
Firearms / Armas de Fuego	3.8	43.9	49.8	43.1	48.5	63.9
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.3	0.4	0.6	0.7	0.5
Drowning / Ahogamiento	3.8	0.5	1.0	1.3	1.3	1.7
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.4	0.9	1.6	2.3	1.9
Other / Otros	3.8	2.6	3.0	2.7	2.4	1.7
Central America / América Central						
Suffocation / Asfixia	0.0	22.5	22.0	27.6	24.6	24.7
Poisoning / Envenenamiento	0.0	71.5	69.1	60.4	61.5	55.2
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	0.3	0.4	1.0	1.2	2.0
Firearms / Armas de Fuego	0.0	4.9	7.2	9.1	10.4	16.7
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.0
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.0
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.1	0.5	0.7	0.8	1.0
Other / Otros	100.0	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3

Region / Región	Age / Edad					
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Latin Caribbean / Caribe Latino						
Suffocation / Asfixia	100.0	43.6	47.9	57.2	63.0	66.0
Poisoning / Envenenamiento	0.0	17.9	17.5	17.3	15.0	11.8
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	3.4	1.5	2.2	2.7	2.1
Firearms / Armas de Fuego	0.0	16.9	15.8	7.4	4.8	4.4
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	13.2	12.3	11.2	10.1	10.9
Drowning / Ahogamiento	0.0	1.6	0.9	0.8	0.9	0.9
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.3	1.1	1.5	2.1	1.6
Other / Otros	0.0	3.1	3.0	2.4	1.4	2.3
South America* / América del Sur*						
Suffocation / Asfixia	61.5	45.9	48.0	50.8	50.7	48.5
Poisoning / Envenenamiento	15.4	28.3	20.6	18.7	14.2	10.3
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	2.6	1.3	1.8	2.2	3.0	2.8
Firearms / Armas de Fuego	15.4	21.5	25.8	22.6	23.8	28.7
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.2	0.3	0.8	1.1	0.9
Drowning / Ahogamiento	2.6	0.6	0.5	0.9	1.7	2.4
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.3	0.7	1.1	1.5	1.7
Other / Otros	2.6	2.0	2.3	2.8	4.0	4.7
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino						
Suffocation / Asfixia	0.0	21.7	29.6	27.0	21.7	29.5
Poisoning / Envenenamiento	100.0	72.0	65.3	64.2	71.7	62.5
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0
Firearms / Armas de Fuego	0.0	0.0	0.5	3.3	1.8	1.1
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	2.5	3.6	2.6	2.9	2.3
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.6	0.5	0.6	0.4	1.1
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	0.0
Other / Otros	0.0	2.5	0.5	1.9	0.0	3.4

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 4.6. Methods used in suicide by age and subregions of the Americas, percent for males, 2000-2004.

Cuadro 4.6. Métodos de suicidio utilizados según la edad y las subregiones de las Américas, porcentaje en hombres, 2000-2004.

Region / Región	Age / Edad					
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Americas / América						
Suffocation / Asfixia	78.4	50.8	44.9	41.3	32.0	29.7
Poisoning / Envenenamiento	4.5	9.7	11.5	15.7	16.6	10.6
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	1.7	2.3	2.1	1.9	1.7
Firearms / Armas de Fuego	9.1	34.2	36.5	34.7	42.7	51.8
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.3	0.4	0.7	0.7	0.7
Drowning / Ahogamiento	2.3	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.4	0.8	1.6	2.2	1.7
Other / Otros	5.7	2.4	2.9	3.0	2.9	2.5
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe						
Suffocation / Asfixia	75.0	58.6	55.6	56.8	56.4	55.3
Poisoning / Envenenamiento	6.3	13.8	15.5	15.9	14.8	11.7
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	1.4	1.7	1.7	1.8	1.6
Firearms / Armas de Fuego	10.9	22.4	22.4	19.0	19.5	23.7
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.3	0.4	0.8	0.9	0.9
Drowning / Ahogamiento	1.6	0.6	0.6	0.8	1.0	1.1
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.4	0.8	1.4	1.7	1.7
Other / Otros	6.3	2.5	3.0	3.6	3.9	4.1
North America* / América del Norte*						
Suffocation / Asfixia	87.5	41.4	32.5	29.7	19.6	12.5
Poisoning / Envenenamiento	0.0	4.9	6.8	15.5	17.6	9.9
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	2.1	2.9	2.4	2.0	1.8
Firearms / Armas de Fuego	4.2	48.1	53.0	46.4	54.5	70.8
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5
Drowning / Ahogamiento	4.2	0.5	0.9	1.1	1.0	1.2
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.4	0.9	1.7	2.5	1.8
Other / Otros	4.2	2.3	2.7	2.6	2.3	1.4
Central America / América Central						
Suffocation / Asfixia	0.0	33.5	26.4	30.9	26.8	24.5
Poisoning / Envenenamiento	0.0	57.9	62.9	55.9	58.6	54.0
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	0.5	0.5	0.9	1.0	1.9
Firearms / Armas de Fuego	0.0	7.2	8.7	10.2	11.3	18.1
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.2	0.7	0.9	0.8	1.1
Other / Otros	100.0	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4

Region / Región	Age / Edad					
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Latin Caribbean / Caribe Latino						
Suffocation / Asfixia	100.0	55.4	55.8	65.9	73.5	76.1
Poisoning / Envenenamiento	0.0	10.3	16.0	14.8	11.6	9.2
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	3.8	1.4	2.0	2.1	1.8
Firearms / Armas de Fuego	0.0	22.5	18.2	8.8	6.0	5.7
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	2.3	3.3	3.2	2.4	2.2
Drowning / Ahogamiento	0.0	1.9	0.8	0.8	0.8	0.9
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.0	1.4	1.7	2.3	1.6
Other / Otros	0.0	3.8	3.3	2.8	1.3	2.6
South America* / América del Sur *						
Suffocation / Asfixia	66.7	55.1	51.9	53.3	52.6	49.8
Poisoning / Envenenamiento	7.4	14.2	14.6	15.7	13.1	9.4
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.0
Firearms / Armas de Fuego	18.5	26.6	28.4	24.2	25.6	31.3
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.2	0.3	0.6	0.7	0.7
Drowning / Ahogamiento	3.7	0.5	0.4	0.8	1.3	1.5
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.4	0.7	1.2	1.6	1.6
Other / Otros	3.7	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino						
Suffocation / Asfixia	0.0	29.2	36.5	29.0	23.7	31.8
Poisoning / Envenenamiento	100.0	67.4	61.3	63.7	71.0	62.1
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Firearms / Armas de Fuego	0.0	0.0	0.7	3.7	2.1	1.5
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	0.0
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.0	0.7	0.5	0.4	1.5
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0
Other / Otros	0.0	2.2	0.7	2.2	0.0	3.0

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 4.7. Methods used in suicide by age and subregions of the Americas, percent for females, 2000-2004.

Cuadro 4.7. Métodos de suicidio utilizados según la edad y las subregiones de las Américas, porcentaje en mujeres, 2000-2004.

Region / Región	Age / Edad					
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Americas / América						
Suffocation / Asfixia	60.0	38.6	33.4	27.1	21.0	24.7
Poisoning / Envenenamiento	30.0	38.4	35.8	37.0	40.2	29.4
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	5.0	1.9	3.7	3.4	3.8	4.1
Firearms / Armas de Fuego	5.0	16.0	19.2	22.7	24.5	27.3
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	1.0	1.9	3.0	2.8	4.1
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.7	1.2	1.9	2.2	4.1
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.3	0.7	1.1	1.8	2.1
Other / Otros	0.0	3.2	4.2	3.8	3.8	4.1
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe						
Suffocation / Asfixia	55.6	34.5	33.1	38.1	40.6	42.8
Poisoning / Envenenamiento	33.3	46.5	42.7	33.4	24.5	18.5
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	5.6	1.6	3.0	3.3	5.8	5.3
Firearms / Armas de Fuego	5.6	12.3	12.9	10.7	10.1	9.2
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	1.2	2.8	6.5	7.6	10.5
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.6	1.0	1.7	2.7	4.7
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.2	0.5	0.9	1.7	2.0
Other / Otros	0.0	3.1	3.9	5.4	7.0	6.9
North America* / América del Norte*						
Suffocation / Asfixia	100.0	50.5	33.7	20.2	13.6	14.9
Poisoning / Envenenamiento	0.0	15.2	23.7	39.3	46.1	35.3
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	3.0	4.8	3.5	3.0	3.5
Firearms / Armas de Fuego	0.0	26.5	30.1	30.1	29.9	37.2
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.2	0.4	0.8	0.9	0.6
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.7	1.7	2.0	2.0	3.8
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.4	0.9	1.2	1.9	2.1
Other / Otros	0.0	3.5	4.6	2.8	2.6	2.6
Central America / América Central						
Suffocation / Asfixia	0.0	10.0	8.8	12.7	11.4	26.5
Poisoning / Envenenamiento	0.0	86.7	87.6	80.7	78.8	64.7
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	0.2	0.0	1.5	2.3	2.9
Firearms / Armas de Fuego	0.0	2.2	2.9	3.9	5.3	5.9
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.0	0.7	0.2	0.8	0.0
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0
Other / Otros	100.0	0.9	0.0	0.2	0.8	0.0

Region / Región	Age / Edad					
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Latin Caribbean / Caribe Latino						
Suffocation / Asfixia	100.0	19.8	16.1	25.0	30.4	37.4
Poisoning / Envenenamiento	0.0	33.0	23.7	26.6	25.6	19.4
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	2.8	2.2	2.7	4.6	2.8
Firearms / Armas de Fuego	0.0	5.7	6.5	2.1	1.4	0.7
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	34.9	48.4	41.2	33.8	35.6
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.9	0.0	0.4	1.4	1.7
Other / Otros	0.0	1.9	2.2	0.9	1.8	1.4
South America* / América del Sur *						
Suffocation / Asfixia	50.0	32.0	32.5	39.8	42.1	42.0
Poisoning / Envenenamiento	33.3	49.7	44.4	32.7	19.4	15.1
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	8.3	1.3	3.0	4.3	7.4	6.7
Firearms / Armas de Fuego	8.3	13.8	15.3	14.9	15.8	14.6
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.1	0.5	1.4	2.7	2.2
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.7	0.9	1.6	3.9	7.5
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.1	0.5	1.0	1.2	2.2
Other / Otros	0.0	2.3	3.0	4.3	7.4	9.7
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino						
Suffocation / Asfixia	0.0	10.4	13.6	17.6	6.5	22.7
Poisoning / Envenenamiento	100.0	79.1	74.6	66.4	77.4	63.6
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
Firearms / Armas de Fuego	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	6.0	11.9	12.0	16.1	9.1
Drowning / Ahogamiento	0.0	1.5	0.0	0.8	0.0	0.0
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Other / Otros	0.0	3.0	0.0	0.8	0.0	4.5

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 4.8. Methods used in suicide by age and selected countries in the Americas, percent of total for both sexes, 2000-2004.

Cuadro 4.8. Métodos de suicidio utilizados según la edad en determinados países de las Américas, porcentaje del total para ambos sexos, 2000-2004.

Region / Región	Age / Edad					
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Brazil / Brasil						
Suffocation / Asfixia	70.6	49.8	50.2	52.3	55.4	57.8
Poisoning / Envenenamiento	5.9	17.5	15.8	16.3	14.3	11.6
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	2.8	3.5	2.5	2.7	2.0
Firearms / Armas de Fuego	11.8	21.6	20.9	17.1	15.1	16.3
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	1.1	1.3	2.1	2.2	2.5
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.7	1.1	1.3	1.4	1.7
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.5	1.0	1.6	1.9	1.9
Other / Otros	11.8	6.2	6.4	6.9	7.0	6.1
Canada / Canadá						
Suffocation / Asfixia	68.0	58.0	47.1	35.0	28.9	30.0
Poisoning / Envenenamiento	7.8	13.7	25.0	32.3	27.4	22.6
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	3.6	6.4	5.3	4.2	5.0	6.3
Firearms / Armas de Fuego	15.5	13.6	13.3	18.4	27.0	27.6
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.1	0.3	0.7	0.8	0.9	0.6
Drowning / Ahogamiento	1.1	1.4	2.2	2.9	4.9	5.2
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.2	1.4	2.0	3.0	2.8	4.1
Other / Otros	3.5	5.1	4.4	3.4	3.0	3.7
Chile						
Suffocation / Asfixia	80.2	80.0	78.0	72.1	69.9	70.7
Poisoning / Envenenamiento	5.6	4.7	7.5	10.1	8.2	6.5
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.7	0.9	1.2	0.8	1.3	1.0
Firearms / Armas de Fuego	10.7	11.9	8.8	11.4	16.1	15.1
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.7	0.6	1.3	1.1	0.6	0.5
Drowning / Ahogamiento	0.9	0.1	0.7	1.0	1.1	1.5
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.3	0.9	0.6	1.1	0.8	2.2
Other / Otros	0.9	0.9	1.9	2.3	2.1	2.5
Cuba						
Suffocation / Asfixia	38.8	43.6	57.5	64.7	66.7	77.7
Poisoning / Envenenamiento	18.5	19.8	17.5	13.7	12.2	6.8
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	3.4	1.6	2.0	2.5	2.2	2.4
Firearms / Armas de Fuego	15.2	9.9	3.2	2.3	0.8	0.6
Fire-Flame / Fuego-llamas	23.0	23.5	15.8	13.0	13.9	9.5
Drowning / Ahogamiento	0.6	0.0	0.7	0.7	0.8	1.2
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.4	1.6	2.5	1.8	1.2
Other / Otros	0.6	1.2	1.7	0.7	1.5	0.6

Region / Región	Age / Edad					
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Mexico / México						
Suffocation / Asfixia	95.0	69.8	72.6	70.8	61.9	54.3
Poisoning / Envenenamiento	0.0	11.7	8.4	8.7	11.2	11.1
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	0.6	0.9	0.6	1.2	1.4
Firearms / Armas de Fuego	0.0	15.4	15.3	15.9	20.4	27.4
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.7	0.5	0.5	0.6	0.4
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.4	0.6	1.4	1.9	1.9
Other / Otros	5.0	1.3	1.5	1.9	2.5	3.3
Nicaragua						
Suffocation / Asfixia	19.2	18.4	24.4	24.2	19.6	22.2
Poisoning / Envenenamiento	75.9	75.3	64.8	68.0	66.1	51.1
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	0.2	0.1	0.5	0.0	0.0
Firearms / Armas de Fuego	3.0	4.2	8.0	4.6	10.7	11.1
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
Drowning / Ahogamiento	0.2	0.5	0.3	0.5	0.0	4.4
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.2	0.5	0.6	0.5	3.6	8.9
Other / Otros	1.5	0.7	1.5	1.5	0.0	2.2
United States / Estados Unidos						
Suffocation / Asfixia	39.9	29.7	25.3	15.9	11.2	10.2
Poisoning / Envenenamiento	6.8	8.6	19.9	23.5	13.7	9.5
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	2.1	2.8	2.3	2.0	1.9	2.1
Firearms / Armas de Fuego	47.6	54.1	46.8	52.4	68.1	73.3
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.2
Drowning / Ahogamiento	0.5	0.9	1.1	1.0	1.4	1.4
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.4	0.8	1.6	2.2	1.8	1.7
Other / Otros	2.4	2.7	2.4	2.3	1.5	1.4
Uruguay						
Suffocation / Asfixia	55.1	52.7	48.1	41.5	47.3	39.0
Poisoning / Envenenamiento	2.6	3.4	4.1	7.7	3.2	3.7
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	3.8	0.7	1.9	3.4	2.3	1.8
Firearms / Armas de Fuego	35.9	37.8	38.9	37.9	38.2	46.9
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.7	1.0	0.8	1.4	0.6
Drowning / Ahogamiento	1.3	1.4	3.1	4.1	5.0	4.6
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	2.0	1.0	2.1	0.9	1.8
Other / Otros	1.3	1.4	1.9	2.6	1.8	1.5

Table 4.9. Methods used in suicide by age and selected countries in the Americas, percent for males, 2000-2004.

Cuadro 4.9. Métodos de suicidio utilizados según la edad en determinados países de las Américas, porcentaje en hombres, 2000-2004.

Region / Región	Age / Edad					
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Brazil / Brasil						
Suffocation / Asfixia	70.6	55.9	54.3	55.9	58.8	59.9
Poisoning / Envenenamiento	5.9	8.3	11.6	12.9	12.1	10.8
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	2.6	3.1	2.2	1.9	1.3
Firearms / Armas de Fuego	11.8	25.8	22.4	18.8	16.9	18.3
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.5	0.7	1.0	1.1	1.0
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.6	1.1	1.7	1.7	1.8
Other / Otros	11.8	5.7	5.9	6.4	6.4	5.9
Canada / Canadá						
Suffocation / Asfixia	65.6	57.9	49.6	38.3	29.9	31.0
Poisoning / Envenenamiento	7.0	11.9	20.8	25.3	21.1	16.7
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	3.5	6.3	4.9	3.7	4.6	5.5
Firearms / Armas de Fuego	19.1	16.2	15.8	23.4	34.7	34.2
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.1	0.3	0.6	0.5	0.9	0.5
Drowning / Ahogamiento	1.0	1.3	1.9	2.3	3.5	4.9
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.2	1.3	2.1	3.3	2.6	4.0
Other / Otros	3.4	4.8	4.3	3.2	2.8	3.1
Chile						
Suffocation / Asfixia	84.3	81.9	79.9	73.8	72.2	72.5
Poisoning / Envenenamiento	2.2	2.5	5.9	8.6	6.6	4.9
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.4	1.0	1.0	0.5	0.7	0.8
Firearms / Armas de Fuego	10.8	12.9	9.1	11.8	16.9	16.9
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.8	0.6	1.3	1.1	0.4	0.2
Drowning / Ahogamiento	0.6	0.0	0.5	0.7	0.4	1.1
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.4	0.8	0.6	1.1	0.9	1.7
Other / Otros	0.6	0.4	1.7	2.3	2.0	1.9
Cuba						
Suffocation / Asfixia	55.8	57.6	69.9	78.6	81.1	88.1
Poisoning / Envenenamiento	11.5	19.2	15.5	9.9	9.2	3.8
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	2.9	1.1	1.8	2.2	1.9	2.1
Firearms / Armas de Fuego	24.0	13.0	4.1	2.7	1.0	0.8
Fire-Flame / Fuego-llamas	3.8	6.8	4.2	2.6	2.6	2.2
Drowning / Ahogamiento	1.0	0.0	0.5	0.5	0.7	0.9
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.6	2.1	3.0	1.9	1.3
Other / Otros	1.0	1.7	2.0	0.7	1.7	0.7

Region / Región	Age / Edad					
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Mexico / México						
Suffocation / Asfixia	94.1	77.1	75.9	72.8	63.3	55.5
Poisoning / Envenenamiento	0.0	4.2	4.7	6.1	8.3	8.8
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	0.4	0.7	0.6	1.0	0.7
Firearms / Armas de Fuego	0.0	16.2	15.9	16.8	22.5	29.7
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.7	0.4	0.4	0.5	0.3
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.4	0.7	1.5	2.0	1.9
Other / Otros	5.9	0.9	1.6	1.7	2.2	2.9
Nicaragua						
Suffocation / Asfixia	29.7	23.6	29.6	27.5	22.0	22.5
Poisoning / Envenenamiento	63.8	69.2	57.9	64.7	64.0	50.0
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	0.3	0.2	0.7	0.0	0.0
Firearms / Armas de Fuego	4.5	4.6	9.2	4.6	10.0	12.5
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
Drowning / Ahogamiento	0.4	0.7	0.2	0.7	0.0	5.0
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.4	0.7	0.7	0.7	4.0	7.5
Other / Otros	1.2	1.0	1.8	1.3	0.0	2.5
United States / Estados Unidos						
Suffocation / Asfixia	38.5	29.7	27.2	17.2	10.7	8.7
Poisoning / Envenenamiento	4.7	6.3	14.9	16.6	8.7	6.0
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	1.9	2.5	2.1	1.8	1.5	1.6
Firearms / Armas de Fuego	51.6	57.0	50.2	58.4	74.6	79.9
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.2
Drowning / Ahogamiento	0.4	0.8	1.0	0.8	1.0	0.9
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.4	0.8	1.7	2.4	1.7	1.6
Other / Otros	2.2	2.5	2.4	2.2	1.3	1.2
Uruguay						
Suffocation / Asfixia	62.3	55.2	51.5	45.9	50.0	37.5
Poisoning / Envenenamiento	1.9	3.2	3.0	4.4	2.2	2.2
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	1.9	0.8	1.2	1.0	1.1	0.4
Firearms / Armas de Fuego	30.2	37.6	38.6	40.8	40.6	52.0
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.8	0.9	0.7	0.6	0.4
Drowning / Ahogamiento	1.9	0.0	1.8	2.7	3.9	4.7
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	1.6	0.9	2.4	0.6	1.8
Other / Otros	1.9	0.8	2.1	2.0	1.1	1.1

Table 4.10. Methods used in suicide by age and selected countries in the Americas, percent for females, 2000-2004.

Cuadro 4.10. Métodos de suicidio utilizados según la edad en determinados países de las Américas, porcentaje en mujeres, 2000-2004.

Region / Región	Age / Edad					
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Brazil / Brasil						
Suffocation / Asfixia	0.0	38.4	33.1	37.3	42.0	48.0
Poisoning / Envenenamiento	0.0	34.5	33.1	30.1	23.1	15.4
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	3.2	4.8	3.7	5.9	5.2
Firearms / Armas de Fuego	0.0	13.7	14.3	10.2	8.0	7.0
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	2.1	3.5	6.5	6.3	9.6
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.8	1.7	2.6	2.9	5.0
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.3	0.9	0.9	2.4	2.4
Other / Otros	100.0	6.9	8.6	8.8	9.5	7.4
Canada / Canadá						
Suffocation / Asfixia	74.9	58.6	37.8	25.4	25.9	26.1
Poisoning / Envenenamiento	10.1	21.6	40.6	52.8	47.0	46.4
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	4.0	6.8	6.8	5.5	6.5	9.2
Firearms / Armas de Fuego	5.5	2.5	4.0	3.7	3.1	0.7
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.4	1.2	1.5	0.8	1.0
Drowning / Ahogamiento	1.5	2.2	3.5	4.7	9.3	6.1
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.3	1.4	1.5	2.1	3.7	4.4
Other / Otros	3.7	6.5	4.6	4.3	3.7	6.1
Chile						
Suffocation / Asfixia	67.7	68.2	66.8	61.8	53.2	57.1
Poisoning / Envenenamiento	16.2	18.6	17.0	19.1	19.5	18.6
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	1.8	0.0	2.2	3.2	5.2	2.9
Firearms / Armas de Fuego	10.2	6.2	7.1	8.8	10.4	1.4
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.6	0.8	1.4	1.2	2.6	2.9
Drowning / Ahogamiento	1.8	0.8	1.8	2.8	6.5	4.3
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	1.6	0.6	1.2	0.0	5.7
Other / Otros	1.8	3.9	3.2	2.0	2.6	7.1
Cuba						
Suffocation / Asfixia	14.9	6.1	21.2	28.7	34.6	38.6
Poisoning / Envenenamiento	28.4	21.2	23.4	23.6	19.0	18.1
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	4.1	3.0	2.4	3.4	3.0	3.4
Firearms / Armas de Fuego	2.7	1.5	0.5	1.2	0.4	0.0
Fire-Flame / Fuego-llamas	50.0	68.2	50.0	39.8	39.2	36.9
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.0	1.1	1.2	1.1	2.4
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.0	0.4	1.2	1.5	0.7
Other / Otros	0.0	0.0	0.9	0.7	1.1	0.0

Region / Región	Age / Edad					
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Mexico / México						
Suffocation / Asfixia	100.0	53.6	54.8	57.5	54.3	46.8
Poisoning / Envenenamiento	0.0	28.6	28.3	25.1	27.0	25.2
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	1.1	2.3	0.9	2.5	5.8
Firearms / Armas de Fuego	0.0	13.6	12.4	10.1	9.1	12.9
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.2	0.0	0.8	1.0	1.4
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.3	0.4	0.9	1.2	1.4
Other / Otros	0.0	2.1	1.2	3.8	4.2	5.8
Nicaragua						
Suffocation / Asfixia	7.9	5.0	4.3	12.2	0.0	20.0
Poisoning / Envenenamiento	89.0	90.8	92.0	80.5	83.3	60.0
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Firearms / Armas de Fuego	1.3	3.3	2.9	4.9	16.7	0.0
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Drowning / Ahogamiento	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
Other / Otros	1.8	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
United States / Estados Unidos						
Suffocation / Asfixia	45.9	29.5	17.9	12.0	13.3	18.7
Poisoning / Envenenamiento	16.2	24.1	39.1	45.2	33.7	30.2
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	2.8	4.4	3.1	2.7	3.1	5.6
Firearms / Armas de Fuego	30.5	34.8	33.5	33.5	41.8	34.7
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.3	0.4	0.8	0.9	0.6	0.4
Drowning / Ahogamiento	0.6	1.6	1.8	1.7	3.0	4.9
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.4	0.9	1.2	1.8	1.9	2.4
Other / Otros	3.5	4.3	2.5	2.3	2.5	3.0
Uruguay						
Suffocation / Asfixia	40.0	39.1	33.8	28.0	35.0	46.9
Poisoning / Envenenamiento	4.0	4.3	8.8	18.3	7.5	12.2
Fall / Precipitación desde un lugar elevado	8.0	0.0	5.0	10.8	7.5	10.2
Firearms / Armas de Fuego	48.0	39.1	40.0	28.0	27.5	18.4
Fire-Flame / Fuego-llamas	0.0	0.0	1.3	1.1	5.0	2.0
Drowning / Ahogamiento	0.0	8.7	8.8	8.6	10.0	4.1
Cut-Pierce / Corte-Punción	0.0	4.3	1.3	1.1	2.5	2.0
Other / Otros	0.0	4.3	1.3	4.3	5.0	4.1

Table 5.1. Correlation coefficients of suicide trends, by sex, in the subregions of the Americas and selected countries, age-unadjusted rates, 1990-2004.

Cuadro 5.1. Coeficientes de correlación de las tendencias del suicidio, por sexo, en las subregiones de las Américas y en determinados países, tasas no ajustadas según la edad, 1990-2004.

Region / Country Región / País	Total		Males / Hombres		Females / Mujeres	
	r	p	r	p	r	p
Americas / América	-0.18	0.53	-0.17	0.54	-0.09	0.74
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	0.81	0.0001	0.85	0.0001	0.56	0.04
North America* / América del Norte*	-0.87	0.0001	-0.90	0.0001	-0.46	0.09
Central America / América Central	0.81	0.0001	0.86	0.0001	0.64	0.02
Latin Caribbean / Caribe latino	-0.36	0.19	-0.37	0.18	-0.34	0.21
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	0.76	0.001	0.78	0.001	0.63	0.02
South America* / América del Sur*	0.68	0.006	0.65	0.009	0.69	0.005
Brazil / Brasil	0.71	0.003	0.76	0.001	0.31	0.92
Canada / Canadá	-0.51	0.06	-0.62	0.02	0.48	0.08
Chile	-0.22	0.43	-0.25	0.37	-0.08	0.77
Cuba	-0.93	0.0001	-0.70	0.008	-0.96	0.0001
Mexico / México	0.98	0.0001	0.98	0.0001	0.96	0.0001
Nicaragua	0.89	0.0001	0.93	0.0001	0.75	0.002
United States/ Estados Unidos	-0.84	0.0001	-0.88	0.0001	-0.51	0.06
Uruguay	0.82	0.002	0.80	0.003	0.64	0.04

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 5.2. Suicide rates per 100,000 population in the subregions of the Americas and selected countries, by year, age-adjusted rates, both sexes, 1990-2004.

Cuadro 5.2. *Tasas de suicidio por 100.000 habitantes en las subregiones de las Américas y en determinados países, por años, tasas ajustadas según la edad, ambos sexos, 1990-2004.*

Region / Country Región / País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Americas / América	7.7	7.9	8.1	8.4	8.3	8.3	8.1	7.9	8.1	7.8	7.7	8.0	7.9	7.9	8.0
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	4.5	4.7	5.3	5.6	5.7	5.7	5.6	5.6	5.9	5.8	5.8	6.1	5.9	5.9	6.0
North America* / América del Norte*	12.3	12.2	12.0	12.2	12.1	12.1	11.8	11.5	11.4	11.0	10.7	11.1	11.3	11.2	11.3
Central America / América Central	5.2	6.1	4.8	4.8	5.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.9	7.1	7.2	7.1	7.8	7.4
Latin Caribbean / Caribe latino	7.0	6.3	14.6	19.7	13.9	13.3	12.0	8.9	12.6	9.5	11.7	8.3	7.9	7.5	7.4
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	6.9	7.3	13.0	10.9	9.8	12.8	9.8	9.6	10.8	14.7	9.4	14.0	13.6	19.4	21.1
South America* / América del Sur*	5.7	5.5	5.8	6.8	6.5	6.2	6.2	5.8	6.6	6.7	6.8	7.1	6.6	6.4	6.7
Brazil / Brasil	4.3	4.7	4.8	4.9	5.1	5.0	4.9	5.1	5.2	4.9	4.7	5.3	5.2	5.2	5.3
Canada / Canadá	12.5	13.1	13.4	13.6	13.2	13.9	13.7	13.1	12.9	13.8	12.3	12.6	12.1	12.7	12.0
Chile	12.9	12.3	9.7	9.8	9.2	9.8	9.5	7.6	8.5	9.3	10.5	10.8	10.2	10.4	10.8
Cuba	-	-	22.4	22.8	21.8	21.1	19.0	19.0	20.4	20.5	18.8	16.2	17.0	15.1	14.9
Mexico / México	2.4	2.8	3.0	3.1	3.5	3.6	3.8	4.2	4.0	4.1	4.1	4.5	4.5	4.8	4.9
Nicaragua	5.9	6.8	7.0	7.7	8.9	-	13.2	13.6	14.0	14.3	14.4	14.0	12.9	14.2	14.3
United States/ Estados Unidos	12.3	12.1	11.9	12.1	11.9	11.9	11.6	11.4	11.3	10.6	10.6	10.9	11.2	11.0	11.2
Uruguay	10.3	-	-	13.2	13.1	13.3	13.3	14.0	15.9	13.7	18.5	16.5	-	-	15.9

*Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Note/Nota: (-) = Data was not available. No se disponía de datos.

Table 5.3. Male suicide rates per 100,000 population in the subregions of the Americas and selected countries, by year, age-unadjusted rates, 1990 – 2004.
Cuadro 5.3. *Tasas de suicidio en hombres, por 100.000 habitantes, en las subregiones de las Américas y en determinados países, por años, tasas no ajustadas según la edad, 1990-2004.*

Region / Country Región / País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Americas / América	12.3	12.6	12.9	13.5	13.3	13.3	12.9	12.6	12.9	12.6	12.4	12.8	12.7	12.7	12.8
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	7.0	7.3	8.2	8.9	8.9	8.8	8.8	8.7	9.3	9.3	9.2	9.6	9.2	9.4	9.6
North America* / América del Norte*	20.0	19.9	19.6	19.9	19.8	19.8	19.4	18.8	18.6	17.8	17.5	18.0	18.3	18.1	18.0
Central America / América Central	8.2	8.6	7.6	7.6	7.9	10.0	10.2	10.0	10.5	11.5	10.4	10.3	10.5	11.9	11.3
Latin Caribbean / Caribe latino	11.9	10.8	18.8	25.3	19.1	18.1	17.2	13.4	17.8	13.9	17.3	12.8	11.8	11.8	11.8
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	10.3	10.7	20.5	18.2	14.9	20.4	15.9	15.8	18.5	22.9	15.1	22.5	22.2	30.7	31.4
South America* / América del Sur*	8.6	8.5	9.1	10.8	10.1	9.5	9.5	8.8	10.1	10.5	10.8	11.0	10.2	9.9	10.6
Brazil / Brasil	6.4	7.3	7.5	7.8	8.1	8.0	7.9	8.2	8.3	8.0	7.5	8.5	8.2	8.4	8.5
Canada / Canadá	19.9	21.1	21.3	21.7	21.1	22.3	21.7	20.9	20.5	22.1	19.3	19.7	19.1	19.6	18.2
Chile	22.3	21.2	16.9	16.6	16.2	17.2	16.8	13.2	14.9	16.4	18.2	18.6	17.4	17.8	18.5
Cuba	-	-	26.1	27.1	27.6	26.8	25.5	26.3	27.4	28.8	26.3	23.3	23.8	22.4	22.2
Mexico / México	4.2	4.8	5.1	5.4	5.9	6.1	6.3	7.1	6.9	7.0	7.0	7.6	7.7	8.1	8.4
Nicaragua	8.4	9.5	10.6	11.6	12.0		17.2	17.7	20.0	19.1	19.5	18.3	18.1	20.8	20.9
United States/ Estados Unidos	20.0	19.8	19.4	19.7	19.6	19.6	19.1	18.6	18.4	17.4	17.3	17.8	18.2	17.9	17.9
Uruguay	16.7	-	-	20.8	21.8	20.9	21.6	23.0	26.2	23.0	31.8	26.7	-	-	26.1

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Note/Nota: (-) = Data was not available. No se disponía de datos

Table 5.4. Female suicide rates per 100,000 population in the subregions of the Americas and selected countries, by year, age-unadjusted rates, 1990 – 2004.

Cuadro 5.4. *Tasas de suicidio en mujeres, por 100.000 habitantes, en las subregiones de las Américas y en determinados países, por años, tasas no ajustadas según la edad, 1990-2004.*

Region / Country Región / País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Americas / América	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.2	3.1	3.3	3.3	3.3	3.4
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	2.1	2.1	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	2.6	2.6	2.5	2.5
North America* / América del Norte*	4.9	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.2	4.4	4.5	4.5	4.9
Central America / América Central	2.1	3.5	2.1	2.0	2.4	4.2	4.1	4.5	3.9	4.3	4.0	4.1	3.8	3.7	3.7
Latin Caribbean / Caribe latino	2.2	1.9	10.3	14.2	8.7	8.4	6.8	4.5	7.5	5.1	6.1	3.9	3.9	3.2	3.1
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	3.6	3.9	5.7	3.8	4.9	5.5	4.0	3.5	3.4	6.6	3.8	5.9	5.2	8.3	10.9
South America* / América del Sur*	2.7	2.6	2.5	2.8	2.9	2.9	2.8	2.7	3.1	2.9	2.9	3.1	3.0	2.9	2.9
Brazil / Brasil	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	2.2	1.8	1.9	2.1	2.3	2.2	2.3
Canada / Canadá	5.2	5.2	5.6	5.6	5.5	5.6	5.9	5.4	5.4	5.8	5.5	5.6	5.3	5.9	5.9
Chile	3.7	3.6	2.6	3.1	2.3	2.6	2.4	2.2	2.2	2.5	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2
Cuba	-	-	18.8	18.4	16.0	15.4	12.5	11.7	13.5	12.2	11.2	9.1	10.1	7.8	7.6
Mexico / México	0.7	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.6	1.5	1.6	1.6
Nicaragua	3.4	4.0	3.5	3.8	5.8	-	9.3	9.5	8.0	9.5	9.3	9.7	7.6	7.7	7.8
United States/ Estados Unidos	4.8	4.7	4.6	4.7	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.1	4.2	4.4	4.4	4.8
Uruguay	4.2	-	-	6.1	5.0	6.2	5.5	5.5	6.3	4.9	6.1	6.9	-	-	6.4

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Note/Nota: (-) = Data was not available. No se disponía de datos

Table 5.5. Correlation coefficients of suicide trends, by age, in the subregions of the Americas and selected countries, 1990 – 2004.
Cuadro 5.5. *Coeficientes de correlación de las tendencias del suicidio, por edad, en las subregiones de las Américas y en determinados países, 1990 al 2004.*

Region / Country Región / País	10-19		20-23		24-44		45-59		60-69		70+	
	r	p	r	p	r	p	r	p	r	p	r	p
Americas / América	0.53	0.05	-0.40	0.14	-0.61	0.02	0.52	0.05	-0.94	0.0001	-0.96	0.0001
Latin America and the Caribbean /												
América Latina y el Caribe	0.94	0.0001	0.79	0.0001	0.66	0.007	0.06	0.84	-0.54	0.04	-0.47	0.08
North America* / América del Norte*	-0.94	0.0001	-0.85	0.0001	-0.71	0.003	0.61	0.02	-0.89	0.0001	-0.99	0.0001
Central America / América Central	0.77	0.001	0.72	0.002	0.52	0.05	0.63	0.02	0.61	0.02	0.16	0.57
Latin Caribbean / Caribe latino	-0.60	0.02	-0.51	0.06	-0.48	0.08	-0.43	0.12	-0.44	0.10	-0.23	0.42
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	0.58	0.03	0.49	0.07	0.74	0.002	0.63	0.02	0.65	0.009	0.55	0.04
South America* / América del Sur*	0.93	0.0001	0.70	0.004	0.24	0.40	-0.13	0.64	-0.72	0.003	-0.67	0.006
Brazil / Brasil	0.60	0.02	-0.24	0.40	0.52	0.05	0.20	0.47	-0.33	0.23	-0.80	0.0001
Canada / Canadá	-0.38	0.16	-0.48	0.07	-0.40	0.14	0.52	0.05	-0.60	0.02	-0.86	0.0001
Chile	-0.34	0.22	-0.34	0.23	-0.21	0.46	-0.25	0.38	-0.71	0.003	-0.64	0.02
Cuba	-0.79	0.001	-0.91	0.0001	-0.96	0.0001	-0.94	0.0001	-0.93	0.0001	-0.91	0.0001
Mexico / México	0.97	0.0001	0.94	0.0001	0.99	0.0001	0.82	0.0001	0.35	0.20	0.08	0.79
Nicaragua	0.84	0.0001	0.77	0.001	0.78	0.001	0.51	0.07	0.54	0.05	0.58	0.03
United States/ Estados Unidos	-0.95	0.0001	-0.81	0.0001	-0.67	0.006	0.54	0.04	-0.88	0.0001	-0.99	0.0001
Uruguay	0.44	0.18	0.77	0.006	0.69	0.02	0.68	0.02	0.68	0.03	0.37	0.26

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 6.1. Percent difference in number of suicide deaths corrected and not corrected for undetermined causes for the subregions of the Americas and selected countries, 2000 – 2004.

Cuadro 6.1. Diferencia porcentual entre el número de muertes por suicidio corregida y no corregida para causas no determinadas en las subregiones de las Américas y en determinados países, 2000-2004.

Region / Región	Total	Males / Hombres	Females / Mujeres
Country / País			
Americas / América	4.3	4.1	5.0
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	5.9	5.9	5.7
North America* / América del Norte*	3.1	2.7	4.4
Central America / América Central	0.4	9.5	12.8
Latin Caribbean / Caribe Latino	4.2	4.5	3.1
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	7.9	8.1	6.9
South America* / América del Sur*	9.0	8.1	11.5
Brazil / Brasil	4.1	4.1	4.3
Canada / Canadá	4.6	4.2	6.0
Chile	2.3	2.4	2.1
Cuba	2.0	2.0	1.9
Mexico / México	3.0	3.0	3.1
Nicaragua	1.8	1.7	2.2
United States/ Estados Unidos	2.9	2.6	4.2
Uruguay	0.2	0.1	0.6

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table 6.2. Ranking and percent contribution (in parentheses) for ages 10-59 of mental illness (ICD Section V) among other causes of death in the subregions of the Americas and selected countries, by sex, 2000 – 2004.

Cuadro 6.2. *Orden de importancia y porcentaje (entre paréntesis) de la contribución de las enfermedades mentales (capítulo V de la CIE) entre otras causas de muerte entre los 10-59 años de edad, en las subregiones de las Américas y en determinados países, según el sexo, 2000-2004.*


Region / Región Country / País	Total	Males / Hombres	Females / Mujeres
Americas / AAmericas / América	24 (1.4)	17 (1.8)	38 (0.7)
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	25 (1.3)	17 (1.7)	45 (0.4)
North America* / América del Norte*	22 (1.7)	15 (2.0)	27 (1.2)
Central America / América Central	9 (3.2)	7 (4.5)	20 (0.5)
Latin Caribbean / Caribe latino	24 (1.3)	18 (1.8)	45 (0.4)
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	26 (1.1)	22 (1.4)	41 (0.5)
South America* / América del Sur*	37 (0.6)	32 (0.7)	52 (0.2)
Brazil / Brasil	21 (1.4)	18 (1.7)	26 (0.5)
Canada / Canadá	20 (1.4)	17 (1.6)	23 (1.1)
Chile	20 (1.8)	15 (2.4)	36 (0.7)
Cuba	22 (1.5)	12 (2.2)	40 (0.4)
Mexico / México	10 (2.9)	8 (4.2)	43 (0.5)
Nicaragua	15 (2.1)	9 (3.0)	45 (0.4)
United States/ Estados Unidos	22 (1.7)	15 (2.0)	27 (1.2)
Uruguay	38 (0.7)	33 (0.8)	41 (0.4)

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

FIGURES / FIGURAS

Figure 1. Percent of suicides among males compared to females in the subregions of the Americas and selected countries, 2000-2004.

Figura 1. Porcentaje de suicidios entre hombres comparado con mujeres en las subregiones de las Américas y en determinados países, 2000-2004.




* Mexico and Brazil are not included. * No se incluye a México ni a Brasil.

Note/Nota: Female=Mujer; Male=Hombre

Figure 2. Methods used in suicide in the subregions of the Americas, percent of total for both sexes, 2000-2004.

Figura 2. Métodos de suicidio utilizados en las subregiones de las Américas, porcentaje del total para ambos sexos, 2000-2004.




Notes/Notas:

Mexico is not included in North America and Brazil is not included in South America. México no está incluido en América del Norte, ni el Brasil en América del Sur.
Suffocation =Asfixia; Poisoning=Envenenamiento; Fall=Caida desde un lugar elevado; Fire/Flame=Fuego/Llamas; Cut/Pierce=Corte/Punción; Other=Otros

Figure 3. Suicide rates in the subregions of the Americas, by year, from 1990 – 2004, age-unadjusted, both sexes.

Figura 3. Tasas de suicidio en las subregiones de las Américas, por años, de 1990 al 2004, no ajustadas por la edad, ambos sexos.



Notes/Notas:


Mexico is not included in North America and Brazil is not included in South America.

Méjico no está incluido en América del Norte, ni el Brasil en América del Sur.

Rate per 100,000 (population) = Tasa por 100.000 (habitantes).

Figure 4. Percent of undetermined intent deaths among external causes, by sex, in the subregions of the Americas, 2000-2004.

Figura 4. Porcentaje de defunciones de intención no determinada entre las causas externas, por sexo, en las subregiones de las Américas, 2000-2004.



Notes/Notas:


Mexico is not included in North America and Brazil is not included in South America.

Méjico no está incluido en América del Norte, ni el Brasil en América del Sur.

Female=Mujer; Male=Hombre

Figure 5. Percent of deaths due to symptoms, signs, and ill-defined conditions, by sex, in the subregions of the Americas, 2000-2004.

Figura 5. Porcentaje de muertes debidas a síntomas, signos y condiciones mal definidas, por sexo, en las subregiones de las Américas, 2000-2004.



Note/Nota: Mexico is not included in North America and Brazil is not included in South America.

Méjico no está incluido en América del Norte, ni el Brasil en América del Sur.

APPENDIX / APÉNDICE

Table A1.1. Age-unadjusted suicide rates per 100,000 population from 1990 – 2004, and last available year.

Cuadro A1.1. Tasas de suicidio por 100.000 habitantes, no ajustadas según la edad, de 1990 al 2004, y el último año disponible.

Country / País	1990-1994			1995-1999			2000-2004			Last Available Year / Último año disponible			
	T	M/H	F/M	T	M/H	F/M	T	M/H	F/M	T	M/H	F/M	Year
Anguilla / Anguila	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2005
Antigua & Barbuda	0.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.2	0.0	2.9	5.9	0.0	2004
Argentina	8.4	13.1	3.9	7.9	12.5	3.4	9.2	14.9	3.7	8.5	13.7	3.6	2005
Aruba	0.0	0.0	0.0	10.5	21.4	0.0	11.1	13.8	8.5	11.1	13.8	8.5	2000
Bahamas	2.0	3.7	0.4	1.3	2.5	0.1	3.6	6.0	1.3	3.6	6.0	1.3	2000
Barbados	5.7	9.4	2.2	6.4	8.9	4.1	2.1	3.6	0.7	0.7	1.4	0.0	2001
Bermuda	7.1	13.8	0.7	7.8	11.9	4.0	3.7	5.5	2.1	4.8	6.6	3.1	2002
Belize / Belice	1.8	3.0	0.5	4.8	9.1	0.4	7.5	12.4	2.5	7.6	13.4	1.6	2001
Bolivia	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	2003
Brazil / Brasil	4.8	7.4	2.2	5.0	8.1	2.1	5.2	8.2	2.2	5.3	8.5	2.3	2004
Canada / Canadá	13.1	21.0	5.4	13.4	21.3	5.6	12.3	19.1	5.6	12.0	18.2	5.9	2004
Cayman Islands / Islas Caimán	2.0	2.8	1.3	1.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2004
Chile	10.7	18.6	3.0	9.0	15.7	2.3	10.5	18.1	3.1	10.3	17.4	3.4	2005
Colombia	4.1	6.4	1.8	5.3	8.1	2.6	6.7	10.0	3.5	6.0	9.2	2.8	2005
Costa Rica	5.4	9.1	1.6	6.1	10.5	1.6	7.2	12.1	2.1	7.2	12.1	2.2	2005
Cuba	13.5	16.3	10.7	19.5	26.5	12.5	16.4	23.6	9.1	12.8	18.9	6.6	2005
Dominica	0.0	0.0	0.0	3.0	4.9	1.1	3.6	5.0	2.3	2.8	2.8	2.8	2004
Dominican Republic / República Dominicana	4.6	7.2	2.0	4.4	7.0	1.7	4.8	8.0	1.6	4.7	7.9	1.6	2004
Ecuador	5.8	7.4	4.2	5.3	7.1	3.5	5.3	7.2	3.4	7.4	10.6	4.2	2005
El Salvador	0.7	0.9	0.5	11.4	14.7	8.2	9.7	13.6	6.1	8.3	12.0	4.8	2005
French Guiana / Guyana Francesa	-	-	-	-	-	-	9.2	15.5	2.6	13.5	15.4	11.6	2005
Grenada / Granada	3.1	6.3	0.0	1.5	2.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2002
Guadeloupe / Guadalupe	-	-	-	-	-	-	9.0	15.2	3.3	10.9	15.2	7.0	2005
Guatemala	3.3	5.3	1.3	3.2	5.0	1.5	3.3	5.0	1.7	3.2	4.7	1.8	2004
Guyana	17.8	25.8	10.2	18.9	31.6	7.0	28.6	44.5	13.0	23.1	34.3	11.6	2005
Haiti / Haití	-	-	-	0.6	0.5	0.6	0.9	1.5	0.3	0.8	1.4	0.0	2004
Honduras	7.7	12.3	3.1	-	-	-	-	-	-	7.7	12.3	3.1	1990
Jamaica	0.1	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	1991
Martinique / Martinica	-	-	-	-	-	-	9.0	15.6	3.1	6.8	12.3	1.9	2005
Mexico / México	3.0	5.1	0.9	3.9	6.7	1.2	4.6	7.8	1.5	4.8	8.2	1.5	2005
Montserrat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2003
Netherlands Antilles / Antillas Holandesas	5.5	7.3	3.9	4.8	8.8	1.3	3.7	7.8	0.0	3.7	7.8	0.0	2000

Country / País	1990-1994			1995-1999			2000-2004			Last Available Year / Último año disponible			
	T	M/H	F/M	T	M/H	F/M	T	M/H	F/M	T	M/H	F/M	Year
Nicaragua	7.2	10.3	4.0	13.5	18.1	8.9	13.7	19.2	8.2	12.5	18.8	6.1	2005
Panama / Panamá	-	-	-	6.2	10.6	1.8	6.8	11.3	2.1	3.2	4.7	1.8	2004
Paraguay	4.5	5.7	3.3	4.9	6.4	3.2	5.7	7.6	3.8	7.8	10.0	5.5	2005
Peru / Perú	2.2	2.6	1.7	3.2	3.9	2.5	1.9	2.6	1.2	1.6	2.4	0.9	2004
Puerto Rico	10.5	19.5	2.1	8.2	15.3	1.6	7.1	13.3	1.4	7.3	13.1	1.9	2005
Saint Kitts and Nevis /													
Saint Kitts y Nevis	0.0	0.0	0.0	5.0	7.1	2.9	2.2	4.4	0.0	2.1	4.1	0.0	2005
Saint Lucia / Santa Lucía	4.8	8.9	0.8	5.6	9.8	1.6	7.1	11.4	3.0	8.6	11.5	5.8	2002
Saint Vincent & Grenadines /													
San Vicente y las Granadinas	10.1	20.3	0.0	6.3	12.0	0.7	5.1	9.4	0.9	3.4	6.8	0.0	2003
Suriname	14.7	20.1	9.4	12.6	18.0	7.3	20.3	29.7	10.9	21.0	34.4	7.5	2005
Turks and Caicos Islands /													
Islas Turcas y Caicos	1.6	0.0	3.3	2.6	2.5	2.6	3.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2005
Trinidad & Tobago	13.3	21.6	5.2	12.8	20.6	5.1	12.9	21.2	5.0	12.0	20.2	4.1	2002
United States / Estados Unidos	12.1	19.7	4.7	11.3	18.6	4.4	11.0	17.8	4.4	11.2	17.9	4.6	2005
Uruguay	12.1	19.6	5.0	13.9	22.7	5.6	16.0	26.6	6.1	15.9	26.1	6.4	2004
Venezuela	5.5	9.2	1.8	6.6	10.9	2.1	6.5	10.7	2.3	5.1	8.3	1.9	2005
UK Virgin Islands/													
Islas Vírgenes Británicas	0.0	0.0	0.0	3.1	6.1	0.0	2.4	2.3	2.4	4.6	9.0	0.0	2003
US Virgin Islands/													
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	-	-	-	4.6	9.6	0.0	4.5	8.7	0.7	0.0	0.0	0.0	2005
Americas / América	8.0	12.7	3.3	8.0	12.8	3.3	7.9	12.7	3.3
Latin America and the Caribbean/													
América Latina y el Caribe	5.1	7.9	2.3	5.7	9.0	2.5	5.9	9.4	2.5
North America* / América del Norte*	12.2	19.8	4.7	11.5	18.9	4.5	11.1	18.0	4.5
Central America / América Central	4.0	6.3	1.8	7.2	10.4	4.1	7.3	10.8	3.8
Latin Caribbean / Caribe latino	10.3	14.1	6.6	10.8	15.5	6.1	8.4	12.9	3.9
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	6.0	9.4	2.7	6.3	9.7	2.9	6.7	10.5	3.0
South America* / América del Sur*	8.9	13.8	4.2	11.5	18.6	4.6	14.1	22.4	6.0

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil. Notes/Notas:

T= Total; M/H= Males/Hombres; F/M=Females/Mujeres.

(...) = Not applicable; No corresponde.

(-) = Data was not available. No se disponía de datos.

Table A1.2. Age-adjusted suicide rates per 100,000 population from 1990 – 2004, and last available year.

Cuadro A1.2. Tasas de suicidio por 100.000 habitantes, ajustadas según la edad, de 1990 al 2004, y el último año disponible.

Country / País	1990-1994			1995-1999			2000-2004			Last Available Year / Último año disponible			
	T	M/H	F/M	T	M/H	F/M	T	M/H	F/M	T	M/H	F/M	Year
Anguilla / Anguila	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2005
Antigua & Barbuda	0.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.5	0.0	5.7	15.4	0.0	2004
Argentina	7.9	12.7	3.6	7.5	12.2	3.2	8.5	14.1	3.5	7.9	12.8	3.3	2005
Aruba	0.0	0.0	0.0	8.8	19.0	0.0	8.9	11.2	6.7	8.9	11.2	6.7	2000
Bahamas	2.0	3.6	0.5	1.1	2.2	0.1	3.6	5.8	1.5	3.6	5.8	1.5	2000
Barbados	5.4	8.8	2.4	5.9	7.5	4.3	1.7	2.9	0.5	0.6	1.2	0.0	2001
Bermuda	5.8	11.5	0.5	6.4	9.6	3.6	2.9	4.3	1.6	3.5	4.8	2.4	2002
Belize / Belice	2.4	4.1	0.6	5.6	10.6	0.5	8.3	14.2	2.2	8.2	14.8	1.5	2001
Bolivia	-	-	-	-	-	-	0.7	0.9	0.5	0.8	0.9	0.7	2003
Brazil / Brasil	5.2	8.3	1.8	5.3	8.6	2.2	5.3	8.5	2.3	5.4	8.7	2.4	2004
Canada / Canadá	11.4	18.3	4.7	11.5	18.3	4.8	10.4	16.0	4.8	10.0	15.2	4.9	2004
Cayman Islands / Islas Caimán	2.0	2.4	1.5	1.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2004
Chile	10.6	19.0	2.9	8.7	15.6	2.3	9.8	17.2	2.9	9.5	16.1	3.1	2005
Colombia	3.9	6.5	1.3	4.9	7.8	2.3	5.8	9.0	2.9	5.4	8.6	2.5	2005
Costa Rica	5.5	9.4	1.3	6.3	11.0	1.6	6.8	11.7	1.8	6.6	11.4	1.8	2005
Cuba	19.5	23.4	15.9	16.3	22.1	10.8	13.0	18.5	7.8	10.4	15.2	5.8	2005
Dominica	0.0	0.0	0.0	3.0	4.5	1.2	3.7	5.1	2.2	2.6	2.6	2.7	2004
Dominican Republic / República Dominicana	4.6	7.3	1.3	4.0	6.5	1.5	4.0	6.6	1.3	3.7	6.0	1.3	2004
Ecuador	5.8	7.7	3.6	5.3	7.4	3.2	5.2	7.4	3.1	7.3	10.8	3.9	2005
El Salvador	0.7	1.0	7.3	10.7	13.3	8.5	9.1	12.2	6.4	7.5	10.6	4.9	2005
French Guiana / Guayana Francesa	-	-	-	-	-	-	9.3	15.8	2.6	13.7	16.3	11.1	2005
Grenada / Granada	3.6	7.5	0.0	1.5	2.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2002
Guadeloupe / Guadalupe	-	-	-	-	-	-	8.1	13.9	2.9	9.4	13.4	5.8	2005
Guatemala	4.1	6.7	1.5	3.9	6.3	1.6	3.9	6.2	1.8	3.6	5.7	1.9	2004
Guyana	18.3	28.1	9.5	19.2	33.7	6.7	28.3	45.0	12.4	22.7	33.9	11.0	2005
Haiti / Haití	-	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0	1.7	0.3	1.0	2.0	0.0	2004
Honduras	7.0	11.3	2.9	-	-	-	-	-	-	7.0	11.3	2.9	1990
Jamaica	0.1	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	1991
Martinique / Martinica	-	-	-	-	-	-	7.3	13.0	2.5	5.5	10.1	1.7	2005
Mexico / México	3.1	5.6	0.8	3.9	6.9	1.1	4.4	7.7	1.4	4.4	7.8	1.4	2005
Montserrat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2003
Netherlands Antilles / Antillas Holandesas	5.1	6.7	3.8	4.6	8.6	1.2	3.9	8.3	0.0	3.9	8.3	0.0	2000

Country / País	1990-1994			1995-1999			2000-2004			Last Available Year / Último año disponible			
	T	M/H	F/M	T	M/H	F/M	T	M/H	F/M	T	M/H	F/M	Year
Nicaragua	8.4	12.9	4.0	14.2	20.8	7.7	14.1	20.5	8.0	11.6	17.9	5.5	2005
Panama / Panamá	-	-	-	6.3	10.8	1.7	6.7	11.6	1.9	7.3	12.2	2.4	2004
Paraguay	4.6	6.1	3.1	4.3	5.8	2.7	4.7	6.4	2.9	5.3	7.5	3.2	2005
Peru / Perú	2.0	2.6	1.3	2.9	3.7	2.0	1.7	2.6	0.9	1.5	2.4	0.7	2004
Puerto Rico	9.6	18.4	1.9	7.3	14.0	1.4	6.2	11.8	1.2	6.1	11.3	1.5	2005
Saint Kitts and Nevis / Saint Kitts y Nevis	0.0	0.0	0.0	5.5	8.4	2.9	2.1	4.3	0.0	1.9	3.8	0.0	2005
Saint Lucia / Santa Lucía	5.3	10.1	0.8	5.8	10.1	1.7	7.2	11.7	3.0	7.9	10.8	5.2	2002
Saint Vincent & Grenadines / San Vicente y las Granadinas	12.1	25.3	0.0	7.1	13.7	0.7	5.6	10.3	1.1	3.6	7.2	0.0	2003
Suriname	14.7	20.8	8.9	13.2	19.8	7.1	20.5	30.5	10.8	20.4	34.2	7.2	2005
Turks and Caicos Islands / Islas Turcas y Caicos	1.5	0.0	3.1	1.0	1.9	0.0	2.5	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2005
Trinidad & Tobago	13.6	22.7	5.0	12.7	21.3	4.8	12.0	20.2	4.5	10.8	18.5	3.5	2002
United States / Estados Unidos	10.4	17.1	4.0	9.7	16.1	3.7	9.4	15.3	3.7	9.4	15.2	3.9	2005
Uruguay	10.5	17.6	4.2	12.0	20.1	4.8	13.6	23.1	5.4	13.5	22.5	5.7	2004
Venezuela	6.1	10.4	1.9	6.9	12.0	2.0	6.1	10.3	2.0	4.6	7.7	1.6	2005
UK Virgin Islands / Islas Vírgenes Británicas	0.0	0.0	0.0	2.6	5.1	0.0	1.7	1.7	1.8	3.4	6.7	0.0	2003
US Virgin Islands / Islas Vírgenes de los Estados Unidos	-	-	-	4.4	9.4	0.0	4.3	8.6	0.7	1.6	3.6	0.0	2005
Americas / América	7.7	12.6	3.2	7.6	12.4	3.1	7.4	11.9	3.1
Latin America and the Caribbean / América Latina y el Caribe	5.5	8.8	2.4	5.8	9.5	2.5	5.8	9.4	2.5
North America* / América del Norte*	10.5	17.2	4.1	9.9	16.3	3.8	9.5	15.3	3.8
Central America / América Central	4.5	7.4	1.8	7.5	11.2	4.1	7.5	11.4	3.9
Latin Caribbean / Caribe Latino	9.7	13.4	6.2	10.1	14.7	5.7	7.6	11.7	3.7
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	6.3	10.2	2.6	6.2	10.1	2.7	6.3	10.2	2.7
South America* / América del Sur*	9.1	14.5	4.1	11.5	19.2	4.4	13.4	21.7	5.7

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Notes/Notas:

T= Total; M/H= Males/Hombres; F/M=Females/Mujeres.

(-) = Data was not available. No se disponía de datos.

(...) = Not applicable. No corresponde.

Table A2.1. Male to female ratio of suicide by age group, 2000 – 2004.

Cuadro A2.1. Razón hombre-mujer de suicidios por grupos de edad, 2000-2004.

Country / País	Age / Edad						Age-adjusted Total	Age-unadjusted Total
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+		
Anguilla / Anguila	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Antigua & Barbuda	1.0	1.0	61.0	49.0	337.0	210.0	55.0	42.0
Argentina	2.4	5.2	4.4	3.4	4.9	7.7	4.0	4.0
Aruba	1.0	1.0	2.7	1.0	1.0	0.8	1.7	1.6
Bahamas	1.0	0.0	127.0	168.0	0.0	1.0	3.9	4.7
Barbados	1.0	48.0	3.1	66.0	1.0	1.0	5.8	5.4
Bermuda	1.0	1.0	1.0	109.0	140.0	1.0	2.7	2.7
Belize / Belice	1.9	2.9	5.3	192.0	127.0	319.0	6.5	5.0
Bolivia	3.3	3.8	1.4	1.1	1.2	1.0	1.8	1.4
Brazil / Brasil	1.7	3.8	4.0	4.0	5.1	5.6	3.7	3.8
Canada / Canadá	2.7	4.0	3.6	2.9	3.2	5.9	3.3	4.0
Cayman Islands / Islas Caimán	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Chile	3.0	6.2	5.9	6.5	8.5	11.5	5.9	5.9
Colombia	0.9	2.5	3.5	5.3	10.7	11.1	3.1	2.8
Costa Rica	2.2	6.8	6.3	9.7	14.5	15.0	6.5	5.6
Cuba	1.1	1.7	2.4	2.4	2.4	4.1	2.4	2.6
Dominica	1.0	0.0	2.9	167.0	1.2	88.0	2.3	2.2
Dominican Republic / República Dominicana	2.1	2.8	4.8	5.1	11.5	5.9	5.1	5.0
Ecuador	0.9	1.9	2.9	5.6	7.5	4.9	2.4	2.1
El Salvador	0.5	1.1	2.3	5.0	7.7	9.7	1.9	2.2
French Guiana / Guyana Francesa	4.7	5.1	7.9	3.1	120.0	226.0	6.1	6.1
Grenada / Granada	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Guadeloupe / Guadalupe	2.0	4.0	6.4	3.8	8.9	3.6	4.8	4.6
Guatemala	1.1	2.8	4.8	4.7	4.0	12.8	3.4	2.9
Guyana	1.1	1.9	4.6	6.4	5.0	6.0	3.6	3.4
Haiti / Haití	0.1	15.0	15.0	3.7	73.0	29.0	5.7	4.4
Martinique / Martinica	1.9	35.0	5.9	3.9	7.6	7.9	5.2	5.0

Country / País	Age / Edad							Age-adjusted Total	Age-unadjusted Total
	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+			
Mexico / México	2.4	6.0	6.9	6.2	7.9	14.0	5.5	5.2	
Montserrat	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Netherlands Antilles /									
Antillas Holandesas	1.0	346.0	111.0	83.0	207.0	1.0	83.0	78.0	
Nicaragua	0.9	2.2	3.6	3.5	8.2	8.6	2.6	2.3	
Panama / Panamá	2.7	5.6	6.8	8.8	5.2	10.5	6.1	5.2	
Paraguay	0.8	1.7	2.4	4.5	3.9	10.1	2.2	2.0	
Peru / Perú	1.1	2.0	2.8	6.7	6.3	14.7	2.9	2.3	
Puerto Rico	5.2	16.8	10.2	7.4	10.9	22.1	9.8	9.3	
Saint Kitts and Nevis /									
Saint Kitts y Nevis	44.0	1.0	30.0	136.0	1.0	169.0	43.0	44.0	
Saint Lucia / Santa Lucía	20.0	4.0	3.2	152.0	1.7	6.4	3.9	3.8	
Saint Vincent & Grenadines /									
San Vicente y las Granadinas	1.0	123.0	10.7	4.1	100.0	370.0	9.4	11.1	
Suriname	2.1	1.0	3.6	7.7	0.8	7.2	2.8	2.7	
Turks and Caicos Islands /									
Islas Turcas y Caicos	1.0	1.0	189.0	1.0	1.0	1.0	49.0	70.0	
Trinidad & Tobago	1.4	3.2	5.6	10.0	5.6	3.3	4.5	4.2	
United States / Estados Unidos	4.2	6.1	3.8	3.2	4.4	8.8	4.1	4.1	
Uruguay	2.0	5.4	4.3	3.4	5.4	9.3	4.3	4.3	
Venezuela	2.0	6.8	5.6	6.2	7.2	9.0	5.2	4.6	
UK Virgin Islands /									
Islas Vírgenes Británicas	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	
US Virgin Islands /									
Islas Vírgenes de los Estados Unidos	1.0	3.2	185.0	6.6	1.0	154.0	12.3	12.6	

Note: As some of the rates were 0, 0.1 was added to those rates to make division possible.
 Nota: Como algunas de las tasas tenía valor 0, se les agregó 0,1 para que fuera posible la división.

Table A3.1. Rates for suicide per 100,000 population by age group, both sexes, 2000 – 2004.

Cuadro A3.1. Tasas de suicidio por 100.000 habitantes por grupos de edad, ambos sexos, 2000-2004.

Country / País	Age / Edad						
	5 - 9	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Anguilla / Anguila	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antigua & Barbuda	0.0	0.0	0.0	3.1	2.4	12.2	8.8
Argentina	0.0	6.4	14.0	9.7	12.6	15.7	18.9
Aruba	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	80.6
Bahamas	0.0	0.0	3.9	6.2	8.0	7.0	0.0
Barbados	0.0	0.0	2.4	3.9	3.2	0.0	0.0
Bermuda	0.0	0.0	0.0	6.2	5.2	6.5	0.0
Belize / Belice	0.0	2.6	16.4	15.1	9.9	6.5	15.1
Bolivia	0.0	0.6	0.9	0.8	1.1	2.0	0.0
Brazil / Brasil	0.0	2.6	7.2	8.1	8.5	7.6	7.8
Canada / Canadá	0.0	6.0	14.3	16.1	18.0	12.1	10.5
Cayman Islands / Islas Caimán	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chile	0.0	4.8	15.6	14.5	15.4	14.4	15.6
Colombia	0.1	5.8	10.4	6.8	7.6	8.7	10.1
Costa Rica	0.0	4.2	9.9	9.9	10.2	9.9	10.4
Cuba	0.0	4.5	13.8	16.3	19.9	26.9	49.1
Dominica	0.0	0.0	6.7	4.1	8.8	9.1	3.7
Dominican Republic / República Dominicana	0.0	1.6	3.7	4.6	6.1	10.1	14.8
Ecuador	0.0	6.1	11.4	6.8	5.8	5.0	5.6
El Salvador	0.0	9.4	16.3	12.3	12.1	9.4	9.2
French Guiana / Guayana							
Francesa	0.9	7.1	10.7	16.8	12.3	6.3	10.4
Grenada / Granada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Guadeloupe / Guadalupe	0.6	1.8	15.3	12.1	12.0	12.1	16.5
Guatemala	0.2	2.9	7.6	5.5	4.8	4.9	6.5
Guyana	0.6	16.5	38.3	47.2	41.3	37.6	27.1

Country / País	Age / Edad						
	5 - 9	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Haiti / Haití	0.0	0.5	0.7	0.7	2.3	3.4	1.3
Martinique / Martinica	0.0	1.0	1.7	12.2	15.5	10.0	19.3
Mexico / México	0.1	3.6	8.6	6.6	5.0	5.2	6.6
Montserrat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netherlands Antilles / Antillas Holandesas	0.0	0.0	17.5	5.1	3.7	9.4	0.0
Nicaragua	0.0	14.6	30.8	20.5	15.4	12.8	12.0
Panama / Panamá	0.0	4.5	9.9	9.8	9.7	9.6	11.6
Paraguay	0.1	5.5	7.3	4.8	5.9	8.5	8.7
Peru / Perú	0.1	1.6	3.1	2.3	2.3	2.5	2.1
Puerto Rico	0.1	1.9	7.1	9.7	11.1	9.4	10.9
Saint Kitts and Nevis / Saint Kitts y Nevis	0.0	2.2	0.0	1.5	6.9	0.0	7.0
Saint Lucia / Santa Lucía	0.0	1.0	12.0	9.0	7.6	21.7	26.1
Saint Vincent & Grenadines / San Vicente y las Granadinas	0.0	0.0	6.1	9.0	12.1	4.6	15.1
Suriname	0.0	14.4	20.2	32.2	31.6	33.0	22.5
Turks and Caicos Islands / Islas Turcas y Caicos	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0
Trinidad & Tobago	0.3	6.4	18.1	18.9	17.5	15.1	20.0
United States / Estados Unidos	0.0	4.5	12.7	14.2	15.6	12.3	16.1
Uruguay	0.1	5.0	19.3	15.5	25.3	27.1	36.1
Venezuela	0.0	4.1	10.2	8.3	7.6	9.2	14.2
UK Virgin Islands / Islas Vírgenes Británicas	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0
US Virgin Islands / Islas Vírgenes de los Estados Unidos	0.0	0.0	12.0	8.5	6.1	0.0	6.3

Table A3.2. Male suicide rates per 100,000 population by age group, 2000 – 2004.

Cuadro A3.2. Tasas de suicidio en hombres por 100.000 habitantes por grupos de edad, 2000-2004.

Country / País	Age / Edad						
	5 - 9	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Anguilla / Anguila	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antigua & Barbuda	0.0	0.0	0.0	6.1	4.9	33.7	21.0
Argentina	0.0	8.9	23.4	15.9	19.8	27.6	40.7
Aruba	0.0	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	67.7
Bahamas	0.0	0.0	0.0	12.7	16.8	0.0	0.0
Barbados	0.0	0.0	4.8	5.9	6.6	0.0	0.0
Bermuda	0.0	0.0	0.0	6.4	10.9	14.0	0.0
Belize / Belice	0.0	3.4	24.1	25.4	19.2	12.7	31.9
Bolivia	0.0	1.0	1.5	1.0	1.1	2.2	0.0
Brazil / Brasil	0.0	3.2	11.3	13.2	13.9	13.3	14.6
Canada / Canadá	0.0	8.6	22.6	25.0	26.9	18.7	20.6
Cayman Islands / Islas Caimán	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chile	0.1	7.1	26.5	24.7	27.1	27.3	34.6
Colombia	0.1	5.5	14.7	10.7	13.2	17.1	21.0
Costa Rica	0.0	5.7	17.0	16.9	18.4	18.9	21.0
Cuba	0.1	4.7	17.2	23.1	28.5	38.3	82.3
Dominica	0.0	0.0	0.0	6.0	16.7	9.9	8.8
Dominican Republic / República Dominicana	0.0	2.1	5.4	7.7	10.1	18.4	25.5
Ecuador	0.0	5.6	14.9	10.1	10.0	9.0	9.8
El Salvador	0.0	6.3	16.9	17.4	21.0	17.7	19.3
French Guiana / Guayana							
Francesa	1.8	11.3	16.9	30.2	17.8	12.0	22.6
Grenada / Granada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Guadeloupe / Guadalupe	1.1	2.4	24.5	21.6	19.8	23.2	29.1
Guatemala	0.3	3.0	11.3	9.5	8.0	8.0	12.8
Guyana	0.6	17.0	50.2	78.7	71.9	64.8	51.2

Country / País	Age / Edad						
	5 - 9	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Haiti / Haití	0.0	0.0	1.5	1.5	3.7	7.3	2.9
Martinique / Martinica	0.0	1.3	3.5	21.8	25.9	19.1	40.1
Mexico / México	0.1	5.1	15.0	11.8	8.7	9.5	14.0
Montserrat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netherlands Antilles / Antillas Holandesas	0.0	0.0	34.6	11.1	8.3	20.7	0.0
Nicaragua	0.0	13.8	42.6	32.6	24.1	23.0	23.3
Panama / Panamá	0.0	6.5	16.7	17.0	17.5	16.1	22.0
Paraguay	0.2	4.8	9.2	6.8	9.4	13.6	17.2
Peru / Perú	0.1	1.6	4.1	3.3	4.0	4.4	4.4
Puerto Rico	0.0	3.1	13.4	18.3	20.7	18.5	24.3
Saint Kitts and Nevis / Saint Kitts y Nevis	0.0	4.4	0.0	3.0	13.6	0.0	16.9
Saint Lucia / Santa Lucía	0.0	2.0	19.3	13.9	15.2	27.7	49.6
Saint Vincent & Grenadines / San Vicente y las Granadinas	0.0	0.0	12.3	16.1	19.6	10.0	37.0
Suriname	0.0	19.4	20.3	50.0	58.1	28.7	42.6
Turks and Caicos Islands / Islas Turcas y Caicos	0.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0
Trinidad & Tobago	0.0	7.4	27.5	32.5	33.1	27.1	33.4
United States / Estados Unidos	0.0	7.1	21.5	22.4	24.0	20.8	34.3
Uruguay	0.0	6.7	32.3	25.4	40.1	49.1	81.1
Venezuela	0.1	5.4	17.7	14.1	13.1	16.6	27.9
UK Virgin Islands / Islas Vírgenes Británicas	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0
US Virgin Islands / Islas Vírgenes de los Estados Unidos	0.0	0.0	18.7	18.5	11.2	0.0	15.4

Table A3.3. Female suicide rates per 100,000 population by age group, 2000 – 2004.

Cuadro A3.3. Tasas de suicidio en mujeres, por 100.000 habitantes por grupos de edad, 2000-2004.

Country / País	Age / Edad						
	5 - 9	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Anguilla / Anguila	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antigua & Barbuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Argentina	0.0	3.7	4.5	3.6	5.9	5.6	5.3
Aruba	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	89.1
Bahamas	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	13.1	0.0
Barbados	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
Bermuda	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
Belize / Belice	0.0	1.8	8.4	4.8	0.0	0.0	0.0
Bolivia	0.0	0.3	0.4	0.7	1.0	1.9	0.0
Brazil / Brasil	0.0	1.9	3.0	3.3	3.5	2.6	2.6
Canada / Canadá	0.0	3.2	5.6	7.0	9.2	5.8	3.5
Cayman Islands / Islas Caimán	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chile	0.0	2.4	4.3	4.2	4.2	3.2	3.0
Colombia	0.1	6.1	6.0	3.1	2.5	1.6	1.9
Costa Rica	0.0	2.6	2.5	2.7	1.9	1.3	1.4
Cuba	0.0	4.3	10.2	9.5	11.7	16.0	20.2
Dominica	0.0	0.0	13.7	2.1	0.0	8.5	0.0
Dominican Republic / República Dominicana	0.0	1.0	1.9	1.6	2.0	1.6	4.3
Ecuador	0.0	6.5	7.8	3.5	1.8	1.2	2.0
El Salvador	0.0	12.7	15.7	7.7	4.2	2.3	2.0
French Guiana / Guayana							
Francesa	0.0	2.4	3.3	3.8	5.7	0.0	0.0
Grenada / Granada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Guadeloupe / Guadalupe	0.0	1.2	6.1	3.4	5.2	2.6	8.1
Guatemala	0.0	2.7	4.1	2.0	1.7	2.0	1.0
Guyana	0.7	15.9	26.4	17.0	11.2	12.9	8.5

Country / País	Age / Edad						
	5 - 9	10 - 19	20 - 24	25 - 44	45 - 59	60 - 69	70+
Haiti / Haití	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Martinique / Martinica	0.0	0.7	0.0	3.7	6.7	2.5	5.1
Mexico / México	0.0	2.1	2.5	1.7	1.4	1.2	1.0
Montserrat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netherlands Antilles / Antillas Holandesas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nicaragua	0.0	15.4	19.2	9.1	6.8	2.8	2.7
Panama / Panamá	0.0	2.4	3.0	2.5	2.0	3.1	2.1
Paraguay	0.0	6.2	5.3	2.8	2.1	3.5	1.7
Peru / Perú	0.0	1.5	2.1	1.2	0.6	0.7	0.3
Puerto Rico	0.1	0.6	0.8	1.8	2.8	1.7	1.1
Saint Kitts and Nevis / Saint Kitts y Nevis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saint Lucia / Santa Lucía	0.0	0.0	4.8	4.4	0.0	16.4	7.7
Saint Vincent & Grenadines / San Vicente y las Granadinas	0.0	0.0	0.0	1.5	4.8	0.0	0.0
Suriname	0.0	9.1	20.1	14.0	7.5	36.7	5.9
Turks and Caicos Islands / Islas Turcas y Caicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Trinidad & Tobago	0.6	5.4	8.6	5.8	3.3	4.8	10.1
United States / Estados Unidos	0.0	1.7	3.5	5.9	7.5	4.7	3.9
Uruguay	0.3	3.3	6.0	5.9	11.7	9.1	8.7
Venezuela	0.0	2.7	2.6	2.5	2.1	2.3	3.1
UK Virgin Islands / Islas Vírgenes Británicas	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
US Virgin Islands / Islas Vírgenes de los Estados Unidos	0.0	0.0	5.8	0.0	1.7	0.0	0.0

Table A4.1. Methods used in suicide, percent of total for both sexes, 2000-2004.

Cuadro A4.1. Métodos de suicidio utilizados, porcentaje del total para ambos sexos, 2000-2004.

Región / País	Suffocation Asfixia	Poisoning Envenenamiento	Fall Precipitación desde un lugar elevado	Firearms Armas de fuego	Fire/Flame Fuego/Llamas	Drowning / Ahogamiento	Cut/Pierce Corte/ Punción	Other / Otros
Antigua & Barbuda	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	28.6
Argentina	52.5	3.2	2.9	0.0	0.9	1.8	0.9	37.9
Aruba	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bahamas	63.6	9.1	0.0	9.1	9.1	0.0	9.1	0.0
Barbados	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bermuda	57.1	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Belize / Belice	51.4	37.8	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	5.4
Bolivia	22.2	16.7	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	55.6
Brazil / Brasil	53.2	15.0	2.7	17.5	2.0	1.3	1.6	6.7
Canada / Canadá	43.0	25.1	5.0	17.2	0.7	2.8	2.4	3.9
Chile	75.9	7.6	1.0	10.9	1.0	0.8	0.9	1.8
Colombia	29.2	33.6	3.5	28.9	0.4	1.0	1.8	1.6
Costa Rica	37.4	36.9	2.0	21.6	0.8	0.2	1.1	0.1
Cuba	63.8	13.7	2.2	2.7	14.0	0.8	1.6	1.1
Dominica	18.2	72.7	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Dominican Republic / República Dominicana	45.3	26.1	0.9	16.8	0.4	1.8	1.0	7.6
Ecuador	37.7	44.8	0.1	13.6	0.1	0.5	0.7	2.5
El Salvador	7.5	88.5	0.1	3.2	0.0	0.3	0.3	0.2
French Guiana / Guayana Francesa	55.9	16.2	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	4.4
Guadeloupe / Guadalupe	47.5	23.8	5.5	13.3	1.7	1.7	0.6	6.1
Guyana	21.9	70.2	0.0	1.3	4.3	0.8	0.0	1.4
Haiti / Haití	32.0	20.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	32.0
Martinique / Martinica	42.9	22.4	11.2	10.0	2.9	1.2	1.2	8.2
Mexico / México	68.1	9.5	0.8	17.7	0.2	0.5	1.2	2.0
Nicaragua	21.5	70.0	0.2	5.7	0.2	0.4	0.7	1.3

Región / País	Suffocation Asfixia	Poisoning Envenenamiento	Fall Precipitación desde un lugar elevado	Firearms Armas de fuego	Fire/Flame Fuego/Llamas	Drowning / Ahogamiento	Cut/Pierce Corte/ Punción	Other / Otros
Panama / Panamá	62.7	22.4	3.1	10.6	0.2	0.0	0.7	0.2
Paraguay	36.1	26.5	1.7	28.1	0.6	1.6	1.1	4.4
Peru / Perú	19.4	64.1	0.6	7.1	0.1	1.0	1.3	6.4
Puerto Rico	68.1	8.6	2.3	15.1	2.3	1.2	1.5	1.1
Saint Kitts and Nevis / Saint Kitts y Nevis	20.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saint Lucia / Santa Lucía	33.3	42.4	0.0	6.1	0.0	0.0	3.0	15.2
Saint Vincent & Grenadines / San Vicente y las Granadinas	8.3	83.3	0.8	0.0	0.0	0.0	4.2	3.3
Suriname	28.1	62.0	0.0	4.1	0.8	0.8	0.0	4.1
Turks and Caicos Islands / Islas Turcas y Caicos	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Trinidad & Tobago	28.7	68.3	0.2	1.4	1.0	0.0	0.0	0.4
United States / Estados Unidos	20.8	17.3	2.2	54.2	0.5	1.1	1.7	2.2
Uruguay	45.4	4.6	2.3	39.8	0.9	3.7	1.4	1.9
Venezuela	57.8	18.5	2.0	18.8	0.5	0.5	0.8	0.9
UK Virgin Islands / Islas Vírgenes Británicas	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
US Virgin Islands / Islas Vírgenes de los Estados Unidos	36.0	4.0	0.0	44.0	0.0	4.0	12.0	0.0

Table A4.2. Methods used in suicide, percentage for males, 2000-2004.

Cuadro A4.2. Métodos de suicidio utilizados, porcentaje en hombres, 2000-2004.

Región / País	Suffocation Asfixia	Poisoning Envenenamiento	Fall Precipitación desde un lugar elevado	Firearms Armas de fuego	Fire/Flame Fuego/Llamas	Drowning / Ahogamiento	Cut/Pierce Corte/ Punción	Other / Otros
Antigua & Barbuda	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	28.6
Argentina	54.5	2.1	1.7	34.4	0.5	1.3	0.8	4.6
Aruba	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bahamas	77.8	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	11.1	0.0
Barbados	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bermuda	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Belize / Belice	61.3	25.8	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	6.5
Bolivia	23.8	14.3	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	52.4
Brazil / Brasil	56.7	11.7	2.2	19.4	1.0	1.0	1.6	6.3
Canada / Canadá	45.0	20.1	4.6	21.2	0.5	2.3	2.5	3.8
Chile	77.9	5.8	0.8	11.5	1.0	0.5	0.8	1.6
Colombia	31.8	25.8	3.4	34.1	0.4	1.0	2.0	1.6
Costa Rica	38.8	34.2	1.8	23.2	0.7	0.2	1.2	0.1
Cuba	76.8	10.7	2.0	3.4	3.2	0.6	1.9	1.3
Dominica	14.3	71.4	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Dominican Republic / República Dominicana	47.6	23.0	0.5	18.1	0.3	1.7	1.1	7.6
Ecuador	42.7	34.8	0.1	18.0	0.1	0.5	0.9	2.9
El Salvador	8.9	86.0	0.1	4.0	0.0	0.4	0.5	0.2
French Guiana / Guayana Francesa	51.7	15.5	0.0	27.6	0.0	0.0	0.0	5.2
Guadeloupe / Guadalupe	53.4	18.5	5.5	13.7	1.4	2.1	0.7	4.8
Guyana	24.8	70.4	0.0	1.7	0.8	0.7	0.0	1.5
Haiti / Haití	35.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	35.0
Martinique / Martinica	48.2	15.8	11.5	11.5	1.4	1.4	1.4	8.6
Mexico / México	70.8	6.0	0.6	19.0	0.1	0.5	1.3	1.8
Nicaragua	27.5	62.4	0.2	6.9	0.1	0.5	1.0	1.4

Región / País	Suffocation Asfixia	Poisoning Envenenamiento	Fall Precipitación desde un lugar elevado	Firearms Armas de fuego	Fire/Flame Fuego/Llamas	Drowning / Ahogamiento	Cut/Pierce Corte/ Punción	Other / Otros
Panama / Panamá	66.0	18.3	2.8	11.8	0.3	0.0	0.7	0.1
Paraguay	40.6	17.2	1.3	32.5	0.3	1.3	1.3	5.3
Peru / Perú	22.5	58.4	0.6	9.2	0.1	1.0	1.6	6.5
Puerto Rico	70.0	6.7	1.9	16.2	1.7	1.3	1.2	1.1
Saint Kitts and Nevis / Saint Kitts y Nevis	20.0	60.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saint Lucia / Santa Lucía	38.5	38.5	0.0	7.7	0.0	0.0	3.8	11.5
Saint Vincent & Grenadines / San Vicente y las Granadinas	9.1	81.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5
Suriname	28.4	59.1	1.1	4.5	1.1	1.1	0.0	4.5
Turks and Caicos Islands / Islas Turcas y Caicos	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Trinidad & Tobago	32.3	65.4	0.0	1.5	0.2	0.0	0.0	0.5
United States / Estados Unidos	21.6	12.2	1.9	59.3	0.5	0.9	1.7	2.1
Uruguay	47.9	3.0	0.9	41.6	0.7	2.8	1.4	1.6
Venezuela	59.9	15.0	1.7	20.9	0.4	0.5	0.8	0.7
UK Virgin Islands / Islas Vírgenes Británicas	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
US Virgin Islands / Islas Vírgenes de los Estados Unidos	34.8	0.0	0.0	47.8	0.0	4.3	13.0	0.0

Table A4.3. Methods used in suicide, percentage for females, 2000-2004.

Cuadro A4.3. Métodos de suicidio utilizados, porcentaje en mujeres, 2000-2004.

Región / País	Suffocation Asfixia	Poisoning Envenenamiento	Fall Precipitación desde un lugar elevado	Firearms Armas de fuego	Fire/Flame Fuego/Llamas	Drowning / Ahogamiento	Cut/Pierce Corte/ Punción	Other / Otros
Antigua & Barbuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Argentina	44.7	7.2	7.2	23.7	2.1	3.8	1.2	10.0
Aruba	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bahamas	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
Barbados	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bermuda	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Belize / Belice	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bolivia	21.4	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1
Brazil / Brasil	39.6	27.8	4.5	10.2	5.8	2.4	1.3	8.5
Canada / Canadá	36.2	41.9	6.3	3.6	1.1	4.3	2.0	4.6
Chile	64.6	17.7	2.3	7.7	1.3	2.3	1.0	3.0
Colombia	20.9	59.3	3.9	11.6	0.6	1.1	1.2	1.4
Costa Rica	28.9	53.1	3.6	11.9	1.5	0.5	0.5	0.0
Cuba	27.4	22.0	3.0	0.7	44.1	1.3	0.8	0.7
Dominica	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Dominican Republic / República Dominicana	33.1	42.5	3.1	10.2	0.8	2.4	0.8	7.1
Ecuador	26.6	67.1	0.0	4.1	0.0	0.4	0.2	1.6
El Salvador	3.9	94.7	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1
French Guiana / Guayana Francesa	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Guadeloupe / Guadalupe	22.9	45.7	5.7	11.4	2.9	0.0	0.0	11.4
Guyana	11.8	69.4	0.0	0.0	16.5	1.2	0.0	1.2
Haiti / Haití	20.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
Martinique / Martinica	19.4	51.6	9.7	3.2	9.7	0.0	0.0	6.5
Mexico / México	54.8	26.9	1.7	11.4	0.6	0.7	0.8	3.2
Nicaragua	6.7	89.2	0.0	2.6	0.2	0.2	0.2	0.9

Región / País	Suffocation Asfixia	Poisoning Envenenamiento	Fall Precipitación desde un lugar elevado	Firearms Armas de fuego	Fire/Flame Fuego/Llamas	Drowning / Ahogamiento	Cut/Pierce Corte/ Punción	Other / Otros
Panama / Panamá	44.5	45.3	4.7	3.9	0.0	0.0	0.8	0.8
Paraguay	26.6	45.7	2.4	19.0	1.0	2.1	0.7	2.4
Peru / Perú	12.5	76.7	0.6	2.5	0.0	1.1	0.6	6.1
Puerto Rico	51.7	24.5	6.3	5.6	7.0	0.0	3.5	1.4
Saint Kitts and Nevis / Saint Kitts y Nevis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saint Lucia / Santa Lucía	14.3	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6
Saint Vincent & Grenadines / San Vicente y las Granadinas	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Suriname	25.0	71.9	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Turks and Caicos Islands / Islas Turcas y Caicos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Trinidad & Tobago	13.4	80.4	1.0	1.0	4.1	0.0	0.0	0.0
United States / Estados Unidos	17.9	37.7	3.3	34.2	0.7	2.1	1.5	2.6
Uruguay	35.1	11.2	7.7	32.3	1.6	7.3	1.6	3.2
Venezuela	47.9	35.4	3.5	8.7	1.1	0.6	0.8	2.0
UK Virgin Islands / Islas Vírgenes Británicas	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
US Virgin Islands / Islas Vírgenes de los Estados Unidos	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table A5.1. Correlation coefficients of suicide trends by sex, age-unadjusted rates.

Cuadro A5.1. Coeficientes de correlación de las tendencias del suicidio según el sexo, tasas no ajustadas según la edad.

Country / País	Years Available / Años disponibles	Total		Males / Hombres		Females / Mujeres	
		r	p	r	p	r	p
Antigua & Barbuda	1990-1995, 2000-2004	0.52	0.10	0.52	0.10	-	-
Argentina	1990-2006	0.35	0.18	0.50	0.06	-0.33	0.22
Belize / Belice	1990-2001	0.73	0.02	0.73	0.02	0.38	0.25
Bermuda	1990-2002	-0.16	0.63	-0.22	0.49	0.03	0.91
Brazil / Brasil	1990-2004	0.71	0.003	0.76	0.001	0.48	0.08
Canada / Canadá	1990-2004	-0.51	0.06	-0.62	0.02	0.48	0.08
Cayman Islands / Islas Caimán	1990-2000, 2004	-0.39	0.21	-0.28	0.38	-0.21	0.51
Chile	1990-2005	-0.18	0.50	-0.23	0.39	0.05	0.87
Colombia	1990-2005	0.84	0.0001	0.85	0.0001	0.82	0.0001
Costa Rica	1990-2005	0.76	0.0001	0.76	0.0001	0.56	0.03
Cuba	1992-2005	-0.94	0.0001	-0.76	0.002	-0.97	0.0001
Dominica	1990-2004	0.53	0.05	0.48	0.08	0.54	0.04
Dominican Republic / República Dominicana	1990-2004	0.05	0.88	0.27	0.36	-0.48	0.09
Ecuador	1990-2005	0.18	0.52	0.37	0.16	-0.28	0.29
El Salvador	1990-2005	-0.79	0.002	-0.63	0.03	-0.83	0.001
Guatemala	1990-2004	-0.05	0.87	-0.20	0.47	0.58	0.03
Guyana	1990-2005	0.62	0.02	0.69	0.005	0.30	0.38
Mexico / México	1990-2005	0.98	0.0001	0.98	0.0001	0.96	0.0001
Nicaragua	1990-1994, 1996-2005	0.84	0.0001	0.91	0.0001	0.64	0.02
Paraguay	1990-1991; 1994-2005	0.81	0.0001	0.81	0.0001	0.55	0.05
Peru / Perú	1990-2004	-0.11	0.71	0.05	0.87	-0.29	0.31
Puerto Rico	1990-2005	-0.90	0.0001	-0.89	0.0001	-0.61	0.02
Saint Kitts and Nevis / Saint Kitts y Nevis	1990-2005	0.22	0.42	0.24	0.38	0.04	0.88
Saint Lucia / Santa Lucía	1991-2002	0.51	0.08	0.27	0.38	0.53	0.07
Saint Vincent & Grenadines/ San Vicente y las Granadinas	1990, 1995-2003	-0.59	0.07	-0.66	0.04	0.10	0.78
Suriname	1990-1992, 1995-2000, 2004. 2005	0.38	0.25	0.48	0.14	0.07	0.85
Turks and Caicos Islands / Islas Turcas y Caicos	1990-2005	0.21	0.44	0.37	0.17	-0.17	0.53
Trinidad & Tobago	1990-2002	-0.17	0.53	-0.22	0.47	-0.32	0.29
United States / Estados Unidos	1990-2005	-0.84	0.0001	-0.87	0.0001	-0.38	0.15
Uruguay	1990, 1993-2001, 2004	0.82	0.0001	0.80	0.003	0.64	0.04
Venezuela	1990, 1992-2005	0.25	0.39	0.17	0.57	0.54	0.05
UK Virgin Islands / Islas Vírgenes Británicas	1990-2003	0.46	0.10	0.35	0.23	0.31	0.29

Note: Statistically significant findings are in bold; a positive correlation (r) suggests a rise in suicide over time and a negative correlation (r) suggests a fall in suicide over time; countries were excluded that did not have at least 10 years of data.

Nota: Los resultados estadísticamente significativos aparecen en negrita; una correlación positiva (r) sugiere un aumento de las tasas de suicidio durante el transcurso del tiempo y una correlación negativa (r) sugiere una caída del suicidio; se excluyeron los países que no poseían datos de por lo menos 10 años.

Table A6.1. Percent estimated under-registration around 2000.

Cuadro A6.1. Porcentaje estimado de subregistro de mortalidad alrededor del año 2000.

Country/ País	Latest 3 years Available/ Últimos tres años disponibles	Crude Death Rate / Tasa bruta de mortalidad		Estimated under registration (%) Subregistro estimado (%)
		Registered/ Registrada	Estimated/ Estimada	
Argentina	2001-2003	7.8	7.8	0
Bahamas	1998-2000	5.6	7.3	23.5
Barbados	1995-2001	8.4	8.8	5.1
Belize / Belice	1991-2001	5.5	5.0	0
Brazil / Brasil	2001-2002	5.5	6.2	11.6
Canada / Canadá	2000-2002	7.1	7.2	1.2
Chile	2001-2003	5.2	5.2	0
Colombia	1999-2001	4.4	5.7	22.3
Costa Rica	2001-2003	5.1	5.1	0
Cuba	2001-2003	6.9	7.1	3.2
Dominican Republic / República Dominicana	2000-2002	3.0	5.2	42.2
Ecuador	2001-2003	4.3	4.3	0
El Salvador	2001-2003	4.4	5.9	24.5
French Guiana / Guyana Francesa	2000-2001	3.9	3.9	0
Guadeloupe/Guadalupe	2000-2001	6.5	6.5	0
Guatemala	2001-2003	5.7	5.7	0
Guyana	1989-1996	7.0	9.9	29.4
Haiti/Haití	2001-2003	1.0	9.8	89.5
Honduras	1989-1990	2.9	7.2	60.0
Jamaica	1989-1991	5.0	7.1	29.6
Martinique / Martinica	2001-2001	7.0	7.0	0
Mexico/México	2001-2003	4.4	4.9	9.7
Netherlands Antilles / Antillas Holandesas	1990-2000	7.0	6.7	0
Nicaragua	2000-2002	2.8	5.0	43.3
Panama/Panamá	2001-2003	4.1	5.0	17.4
Paraguay	2001-2003	3.3	4.5	26.9
Peru/Perú	1998-2000	3.4	6.5	47.8
Puerto Rico	2000-2002	7.4	8.1	9.0
Saint Lucia / Santa Lucía	2001-2002	5.8	7.6	17.8
Saint Vincent & Grenadines / San Vicente y las Granadinas	1998-2000	6.8	6.8	0
Suriname	1990-1992	5.1	6.8	25.2
Trinidad & Tobago	1998-2000	7.6	7.3	0
United States / Estados Unidos	2001-2002	8.4	8.4	0
Uruguay	1999-2001	9.4	9.6	2.6
Venezuela	2000-2002	4.4	4.4	0
UK Virgin Islands / Islas Vírgenes Británicas	-	-	-	-
US Virgin Islands / Islas Vírgenes de los Estados Unidos	2000-2002	5.6	5.6	0.3

Adapted from PAHO 2006. Adaptado de OPS 2006.
Note/ Nota: (-) = Data was not available. No se disponía de datos.

Table A6.2. Percent of undetermined causes of death among external causes, 2000 – 2004.

Cuadro A62. Porcentaje de causas indeterminadas de muerte entre las causas externas, 2000-2004.

Country / País	Total	Males / Hombres	Females/Mujeres
Anguilla / Anguila	0.0	0.0	0.0
Antigua & Barbuda	1.5	1.8	0.0
Argentina	9.4	10.4	6.3
Bahamas	3.7	4.2	2.0
Barbados	4.5	4.8	3.3
Bermuda	4.5	5.4	0.0
Belize/Belice	4.3	4.3	4.3
Bolivia	0.4	0.3	0.4
Brazil / Brasil	4.2	4.2	4.2
Canada / Canadá	3.5	3.6	3.4
Cayman Islands / Islas Caimán	3.0	3.7	0.0
Chile	2.4	2.5	2.1
Colombia	3.5	3.3	4.7
Costa Rica	2.3	2.3	2.2
Cuba	1.7	1.9	1.4
Dominica	5.7	5.7	5.3
Dominican Republic / República Dominicana	27.6	28.3	24.0
Ecuador	4.6	4.4	5.3
El Salvador	0.0	-	0.0
French Guiana / Guayana Francesa	14.5	16.3	7.6
Grenada / Granada	15.1	13.0	21.1
Guadeloupe / Guadalupe	6.7	7.2	5.2
Guatemala	40.4	39.6	44.1
Guyana	10.3	9.5	13.4
Haiti / Haití	1.0	1.0	1.0
Martinique / Martinica	3.6	3.7	3.2
Mexico / México	2.7	2.9	2.2
Montserrat	20.0	33.3	0.0
Netherlands Antilles / Antillas Holandesas	6.5	3.9	18.2
Nicaragua	1.7	1.8	1.5

Country / País	Total	Males / Hombres	Females/Mujeres
Panama/Panamá	1.1	1.1	1.2
Paraguay	7.4	7.4	7.3
Peru / Perú	9.1	9.1	9.0
Puerto Rico	0.3	0.4	0.3
Saint Kitts and Nevis / Saint Kitts y Nevis	3.2	2.9	5.0
Saint Lucia / Santa Lucía	0.4	0.4	0.0
Saint Vincent & Grenadines / San Vicente y las Granadinas	2.0	1.8	3.1
Suriname	29.5	29.6	29.4
Turks and Caicos Islands / Islas Turcas y Caicos	16.1	19.2	0.0
Trinidad & Tobago	1.0	0.8	1.6
United States / Estados Unidos	2.6	2.4	2.8
Uruguay	0.3	0.2	0.5
Venezuela	19.1	20.5	10.8
UK Virgin Islands / Islas Vírgenes Británicas	13.3	11.1	22.2
US Virgin Islands / Islas Vírgenes de los Estados Unidos	0.3	0.3	0.0
Americas / América	5.1	5.3	4.3
Latin America and the Caribbean /			
América Latina y el Caribe	6.4	6.5	6.4
North America* / América del Norte*	2.6	2.5	2.9
Central America / América Central	19.2	18.9	20.5
Latin Caribbean / Caribe Latino	8.5	9.6	5.3
Non-Latin Caribbean / Caribe no Latino	7.3	6.9	8.9
South America* / América del Sur*	8.0	8.4	6.3

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table A6.3. Percent of undetermined intent deaths due to symptoms, signs, and ill-defined conditions of total deaths, 2000-2004.

Cuadro A6.3. Porcentaje de muertes de intención no determinada debido a síntomas, signos o condiciones mal definidas, 2000-2004.

Country / País	Total	Males / Hombres	Females/Mujeres
Anguilla / Anguila	5.4	4.7	6.2
Antigua & Barbuda	2.8	1.7	4.1
Argentina	7.1	7.0	7.3
Aruba	5.6	3.9	7.5
Bahamas	1.5	1.7	1.2
Barbados	4.1	3.6	4.6
Bermuda	1.2	0.8	1.7
Belize/Belice	3.1	3.1	3.2
Bolivia	46.9	46.1	47.8
Brazil / Brasil	13.5	13.0	14.3
Canada / Canadá	1.3	1.3	1.3
Cayman Islands / Islas Caimán	2.7	2.4	3.0
Chile	3.2	2.8	3.7
Colombia	1.9	1.8	2.1
Costa Rica	1.3	1.4	1.3
Cuba	0.7	0.8	0.6
Dominica	8.4	8.8	8.0
Dominican Republic / República Dominicana	8.9	7.9	10.2
Ecuador	12.5	11.5	13.9
El Salvador	12.5	10.9	14.7
French Guiana / Guayana Francesa	29.5	29.7	29.3
Grenada / Granada	2.1	1.9	2.2
Guadeloupe / Guadalupe	8.0	7.1	9.1
Guatemala	10.6	9.7	11.9
Guyana	1.1	0.8	1.4
Haiti / Haití	32.5	34.8	30.0
Martinique / Martinica	7.8	7.2	8.4
Mexico / México	2.0	1.8	2.3
Montserrat	2.5	3.0	2.0
Netherlands Antilles / Antillas Holandesas	4.8	3.3	6.5
Nicaragua	3.6	3.2	4.2

Country / País	Total	Males / Hombres	Females/Mujeres
Panama / Panamá	8.3	8.1	8.5
Paraguay	19.7	18.6	21.1
Peru / Perú	11.2	10.6	11.9
Puerto Rico	0.8	0.8	0.9
Saint Kitts and Nevis / Saint Kitts y Nevis	0.9	1.0	0.7
Saint Lucia / Santa Lucía	7.1	6.1	8.3
Saint Vincent & Grenadines / San Vicente y las Granadinas	2.0	1.8	2.2
Suriname	10.0	8.7	11.7
Turks and Caicos Islands / Islas Turcas y Caicos	13.4	15.6	11.7
Trinidad & Tobago	1.8	1.6	2.1
United States / Estados Unidos	1.3	1.2	1.3
Uruguay	7.6	7.8	7.4
Venezuela	0.9	0.7	1.2
UK Virgin Islands / Islas Vírgenes Británicas	4.4	3.4	5.8
US Virgin Islands / Islas Vírgenes de los Estados Unidos	2.0	1.3	3.0
Americas / América	4.7	4.8	4.7
Latin America and the Caribbean /			
América Latina y el Caribe	8.3	8.1	8.3
North America* / América del Norte*	1.3	1.3	1.3
Central America / América Central	9.0	8.2	10.1
Latin Caribbean / Caribe latino	3.9	3.8	4.0
South America* / América del Sur*	6.2	5.8	6.8
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	2.8	2.4	3.3

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.

Table A6.4. Percent difference in number of suicide deaths corrected and not corrected for undetermined causes, 2000–2004.

Cuadro A6.4. Diferencia porcentual del número de muertes por suicidio corregida y no corregida para causas indeterminadas, 2000-2004.

Country / País	Total	Males / Hombres	Females/Mujeres
Antigua & Barbuda	0.0	0.0	-
Argentina	9.9	10.5	7.6
Aruba	0.0	0.0	0.0
Bahamas	0.0	0.0	0.0
Barbados	0.0	0.0	0.0
Bermuda	0.0	0.0	0.0
Belize / Belice	0.0	0.0	0.0
Bolivia	0.0	0.0	0.0
Brazil / Brasil	4.1	4.1	4.3
Canada / Canadá	4.6	4.2	6.0
Chile	2.3	2.4	2.1
Colombia	3.6	3.3	4.7
Costa Rica	2.3	2.1	3.5
Cuba	2.0	2.0	1.9
Dominica	0.0	0.0	0.0
Dominican Republic / República Dominicana	25.9	26.8	21.1
Ecuador	5.4	4.2	7.5
El Salvador	0.2	0.0	0.0
French Guiana / Guayana Francesa	20.9	17.1	9.1
Grenada / Granada	100	-	-
Guadeloupe / Guadalupe	6.2	6.4	5.4
Guatemala	41.3	39.2	47.1
Guyana	9.7	8.9	12.4
Haiti / Haití	0.0	0.0	0.0
Martinique / Martinica	3.4	3.5	3.1
Mexico / México	3.0	3.0	3.1
Netherlands Antilles / Antillas Holandesas	0.0	0.0	-
Nicaragua	1.8	1.7	2.2

Country / País	Total	Males / Hombres	Females/Mujeres
Panama / Panamá	0.8	0.7	1.5
Paraguay	8.3	7.9	9.1
Peru / Perú	11.1	10.0	13.6
Puerto Rico	0.3	0.3	0.0
Saint Kitts and Nevis / Saint Kitts y Nevis	0.0	0.0	-
Saint Lucia / Santa Lucía	0.0	0.0	0.0
Saint Vincent & Grenadines / San Vicente y las Granadinas	0.0	0.0	-
Suriname	33.1	32.8	33.3
Turks and Caicos Islands / Islas Turcas y Caicos	1.0	0.7	2.0
Trinidad & Tobago	0.2	0.1	0.6
United States / Estados Unidos	2.9	2.6	4.2
Uruguay	0.2	0.1	0.6
Venezuela	18.3	19.3	12.9
UK Virgin Islands / Islas Vírgenes Británicas	0.0	0.0	0.0
US Virgin Islands / Islas Vírgenes de los Estados Unidos	0.0	0.0	0.0
Americas / América	4.3	4.1	5.0
Latin America and the Caribbean /			
América Latina y el Caribe	5.9	5.9	5.7
North America* / América del Norte*	3.1	2.7	4.4
Central America / América Central	10.4	9.5	12.8
Latin Caribbean / Caribe latino	4.2	4.5	3.1
South America* / América del Sur*	7.9	8.1	6.9
Non-Latin Caribbean / Caribe no latino	9.0	8.1	11.5

* Mexico and Brazil are not included. / *No se incluye a México ni a Brasil.
Note/Nota: (-) = Data was not available. No se disponía de datos.

